



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

F1 43  
B63.6



3 2044 106 358 500

PL 43  
B63.6



HARVARD UNIVERSITY

---

LIBRARY


OF THE

GRAY HERBARIUM

---

Received

March 10, 1910.







# FLORA LUCCAVIENSIS

von

**Dr. Reinhold Bohnstedt,**  
Oberlehrer.

~~~~~  
**Beilage zum Programm des Gymnasiums  
zu Luckau.**

—————  
**Luckau.**

**Druck von J. Entleutner & Sohn.**  
**1882.**

wo

14.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.

301.

302.

303.


304.

# FLORA LUCCAVIENSIS

von

291

Dr. Reinhold Bohnstedt,  
Oberlehrer.



Beilage zum Programm des Gymnasiums  
zu Luckau.



Luckau.

Druck von J. Entleutner & Sohn.

1882.

M 75. 1882.



**MAR 10 1910**  
**Gray Herbarium**  
**Harvard University.**

Die Anregung zur Durchforschung der Flora Luckaus und seiner Umgebung wurde durch die wiederholte Anwesenheit des Herrn Professor Dr. Ascherson aus Berlin in den Jahren 1878 und 1879 gegeben. Demselben Herrn spreche ich für die überaus freundliche, allzeit bereite Hülfe bei Sicherstellung mir zweifelhaft gebliebener Arten meinen aufrichtigsten Dank aus.

In der Anordnung und Benennung bin ich fast überall Aschersons „Flora der Provinz Brandenburg“ (Berlin 1864) gefolgt; durch ein † sind bezeichnet die im Gebiet nicht heimischen Arten, in gesperrter Schrift habe ich hinzugefügt die früher namentlich von Rabenhorst (Flora Lusatica Leipzig 1839) als unserem Gebiete angehörig verzeichneten, aber seit 1871 nicht wieder aufgefundenen Arten. Sie bilden demnach ein Verzeichnis von Lücken, die sich z. T. noch ausfüllen werden, obwohl nicht wenige Arten durch die fortschreitende Cultur, durch Beackerung der früher sehr ausgedehnten Viehweiden, durch Abholzungen, sowie durch das Einengen und Trockenlegen der Sümpfe dauernd verschwunden sein mögen, während neue, wenn auch in geringerer Zahl, an ihre Stelle getreten sind.

Das Gebiet umfasst die von Luckau auf Tagesausflügen erreichbaren Orte und grenzt sich ab im Osten bei Wilmersdorf, im Süden bei Gahro und Gross-Mehsow, im Westen bei Kemnitz und der Rochauer Pechhütte, im Norden bei Casel.

Durch ein \* sind diejenigen Standorte bezeichnet, welche schon in Aschersons „Beiträgen zur Flora der mittleren und westlichen Nieder-Lausitz“ (Berlin 1879) aufgeführt sind. Von den daselbst angegebenen Beobachtern sind abgekürzt Ascherson in A., Köhne in Kn., E. Krause in Kr., Löw in L., Matthias in M., Ruhmer in R., A. Schultz in Schu., Troschel in Tr., Tschiersch in Tsch. Hinzugekommen ist als Beobachter der Rek-

tor der hiesigen Knabenschule Herr Schwochow (Schw.), dem ich hierdurch für diesen hocherwünschten Beistand meinen herzlichsten Dank sage. Rabenhorst (Rbh.) habe ich nur angeführt, wo neuere Beobachtungen fehlen.

Für meine Schüler, und lediglich auf sie berechnet, habe ich in Nonpareilleschrift die Angaben zur Unterscheidung der Arten innerhalb der Gattungen hinzugefügt und werde denselben die zur Bestimmung der Gattungen nötigen Tabellen gleichzeitig mit dieser Arbeit zugänglich machen.

### Abkürzungen:

|           |                  |        |                    |
|-----------|------------------|--------|--------------------|
| B.        | Blatt (Blätter). | N. St. | Nächster Standort. |
| beha.     | behaart.         |        |                    |
| Bt.       | Blüte (n).       | O.     | Ort.               |
| Fr.       | Frucht.          | P.     | Perigon.           |
| G.        | Gebiet.          | St.    | Stand.             |
| Gr.       | Grund.           | Stbf.  | Staubfäden.        |
| Ha. (ha.) | Haar (haarig).   | Stg.   | Stengel.           |
| Kch.      | Kelch.           | Stl.   | Stiel.             |
| Kr.       | Krone.           | Wz.    | Wurzel.            |
| Nb.       | Neben.           |        |                    |

Alle sonst vorkommenden Abkürzungen sind entweder aus diesen zusammengesetzt oder ohne Erklärung verständlich; Abkürzungen, welche nur bei einzelnen Familien oder Gattungen vorkommen, finden bei diesen ihre Erklärung.

# PHANEROGAMAE.

## I. Angiospermae.

### A. Dicotyledones.

#### 1. Fam. Ranunculaceae Juss.

**Clematis** L. Waldbrebe.

†C. viticella L. 5—8. St. einzeln, zu 1—3, endständig, viol. od. rot.  
Häufig in Laubenbefeidungen, z. B. Cahnsdf. Part.

†C. vitalba L. 6—8. St. in Trauben, weiß. B. vor.

**Thalictrum** Tourn. Wiesenraute.

a. Stf. pyramidal, Stf. hängend.

T. flexuosum Bernh. 6—8. \*Zöllmersdf. Grabenränder  
zw. Dorf und Chauffee!

b. Stf. mit fast gleich hohen Ästen, St. u. Stf. aufrecht.

T. angustifolium Jacq. 6,7. St. länglich lineal, Bl. ohne  
N. b. \*Langengrassau, Baldwiese i. B. A. 1878. \*Auf  
einer Wiese bei Weissagk 1871 Haberland.

T. flavum L. 6,7. St. länglich keilfg. Bl. mit N. b.  
Im g. G. häufig. N. St. Lu. am östl. Wege nach dem  
Hain und am Fließwege nach Fresdf.

**Hepatica triloba** Gil. Leberblümchen. 3—5. Beesdan;  
Bornsdf. Rbh. In Gärten zur Zierde cultiviert!

**Pulsatilla** Tourn. Ruh- od. Ruchenschelle.

P. vernalis Mill. 3,4. St. rosenrot. Zw. Waltersdf.  
und Wüstermarke Rbh. Kann wohl sicher als ver-  
schwunden gelten!

P. vulgaris Mill. 3—6. St. hellviolett, aufrecht, offen. Du-  
bener Heide Rbh.

*P. pratensis* Mill. 3—6. St. dunkelviolett, nickend, geschlossen.  
\*Ziekau, Weinberg, viel! Vereinzelt auf den Höhen hinter  
Gehren und Waltersdf!

**Anemone nemorosa** L. Windröschen 3—5. St. weiß mit  
rötlichen Abern. Ziemlich häufig auf dem westl. Teile des G.  
N. St. Sandow, Grasgärten im S. Besonders zahlreich  
bei Gossmar (Teiche), Pelkwitz u. a. d. Bäche zw. Zöll-  
mersdf. u. Wierigsdf.

*A. ranunculoides* L. Osterblume. 3—5. St. gelb. Mit vorzi-  
ger an der Bäche!

**Adonis aestivalis** L. Adonisröschen. 5,6. Lu. im N. an  
Leberechts Baumschulen! \*Cahnsdf. Felder an der Calauer  
Chaussee! Fresdf. Felder am Borchelt! Zw. Lu. u. Witt-  
mannsdf. Tsch.

**Myosurus minimus** L. Mäuseschwänzchen. 5,6. Ziemlich  
verbreitet, namentlich im westl. Teile d. G. z. B. Zöllmersdf.  
\*Waltersdf; \*Riedebeck Kr. N. St. Lu. Promenade am  
Stadtgraben!

**Ranunculus** L. Hahnenfuß.

A. St. weiß.

*R. hederaceus* L. 5—9. B. sämtlich nierenfg. In der  
Berste Rbh.

*R. aquatilis* L. 5—8. untergetauchte B. borstenfg. In ste-  
henden und fließenden Gewässern gemein.

B. St. gelb.

1. *R. ficaria* L. Feigwurz. 4,5. Kr.b. 8. ob. mehr. An schatti-  
gen u. feuchten O. gemein.

2. Kr.b. 5.

a. B. ungeteilt, elliptisch ob. lineal.

*R. flammula* L. 5—9. St. klein (bis 1,5 cm.). An sumpfigen  
O. gemein.

*R. lingua* L. 6—8. St. groß (3 cm.). Lu. in den Torfflämpfen  
nicht selten!

b. B. geteilt ob. zerfchnitten.

1. St. klein, Kr.b. wenig länger als d. Rk.

*R. sceleratus* L. 5—10. Bei Lu. häufig auf sumpfigen  
Wiesen und an Gräben, z. B. nördlich der Stadt.

2. St. groß, Kr.b. viel länger als der Rk.

1. Fr. glatt, gefielt.

\* St. fil. rund, nicht gefurcht.

*R. auricomus* L. 3—5. Grundb. z. T. nierenfg., Fr. weichha.  
Auf Wiesen u. in Gebüschen gemein.

*R. acer* L. 4,5. Gr.b. sämtlich tief geteilt, Fr. glatt, Stg. B. fil.  
u. B. angebrückt beha. Auf Wiesen, in Wäldern gemein.

*R. lanuginosus* L. 5—8. Gr.b. sämtlich tief geteilt, Fr.

glatt, Stg. B. u. St. st. rauhsa. Gebüsch bei Pelkowitz Rbh.  
 \*\* St. st. gefurcht.

R. repens L. 5—8. Stg. mit kriechenden Ausläufern. Feuchte Wiesen und Acker gemein.

R. bulbosus L. 5—7. Stg. ohne Ausläufer, am Gr. knollig verdickt, Rh. zurückgeschlagen. Grasplätze u. Begründer gemein.

R. polyanthemus L. 5—7. Stg. ohne Ausläufer, am Gr. nicht knollig, Rh. aufrecht. Nach Rbh. überall häufig, von mir i. G. noch nicht gefunden!

II. Fr. runzlig od. mit Knötchen u. Dörnchen.

R. philonotis Ehrh. (R. sardous Crtz). 5—9. Rh. zurückgeschlagen, St. st. gefurcht. Chaussee nach Riedebeck Tsch. Bornsd. zw. Waltersdf. Gehren, Gossmar und Witmannsd. auf feuchten Aedern häufig!.

R. arvensis L. 5—7. Rh. aufrecht abstehend, St. st. nicht gefurcht. Im Lu. auf Aedern gemein, u. d. d. G. nicht selten.

**Caltha palustris** L. Dotterblume. 4—6. Auf feuchten Wiesen, an Ufern gemein.

†**Trollius europaeus** L. 5,6. In Gärten um Lu. angepflanzt. Schw.

†**Helleborus niger** L. Schwarze Nieswurz. (Mitteldeutschland). 12—4. Stg. einfach, blattlos, St. weiß od. rötlich. In Gärten um Lu. Schw.

†**H. viridis** L. Grüne Nieswurz. (Mitteldeutschland). 3,4. Stg. beblättert, St. grünlich. Pelkowitz; Wierigsdf. Rüttingsdf. in Gärten u. halbwild Rbh.

**Nigella arvensis** L. Schwarzkümmel. 7—9. St. ohne Hülle. Aeder zw. Hindenberg u. Wilmersdf.!

†**N. damascena** L. Braut in Haaren. (Südeuropa). 5—7. St. mit vielteiliger, 5—7 blättriger Hülle. In Gärten angepflanzt u. verw. z. B. Giessmannsd. am Kirchhof!

**Aquilegia vulgaris** L. Akelei. 5—7. Görlsd. Gebüsch am u. im Park in Menge, wohl nur verw. aber durchaus beständig!

**Delphinium consolida** L. Rittersporn. 6—8. Auf Aedern d. d. G. häufig, z. B. \*Cahnsdf. A.

## 2. Fam. Berberidaceae Juss.

**Berberis vulgaris** L. Berberis 5,6. B. nicht lederartig, Beeren zinnoberrot. \*Schlucht bei Wüstermarke, anscheinend wild A. Häufig angepflanzt u. verw., z. B. um Beesdan!

†**B. (Mahonia) aquifolium** Pursh. N.-Amerika 5,6. B. lederartig, Beeren schwarz-purpurn. Zierstrauch u. verw., z. B. Lu. Kirchhof Schw.

## 3. Fam. Nymphaeaceae D.C.

**Nymphaea alba** L. Weiße Seerose. 5—8. In Gewässern häufig, z. B. Lu. Gohmarsches Fließ; Teiche bei Görtsdf. Bornsd. F. Drehna!

**Nuphar luteum** Sm. Gelbe Teichrose. 5—8. In Gewässern d. d. G. häufig, z. B. Lu. in der Berste; im Gohmarschen Fließ; Schüttenteich!

## 4. Fam. Papaveraceae D.C.

**Papaver** Tourn. Mohn.

1. *P. argemone* L. 5—7. Kapseln borstig. Nester, nicht selten, z. B. Lu. bei der Schanze; Cahnsdf.!

2. Kapseln kahl.

†*P. somniferum* L. 6—8. Stgl. kahl. Gebaut.

*P. rhoeas* L. 5—7. Stg. steifh. Narbenlappen 8—12, sich bedend. Auf Nestern nicht selten.

*P. dubium* L. 5—7. Stg. steifh., Vorsten dem St. fl. anliegend, Narbenlappen 7—9, sich nicht bedend. Nester, nicht selten d. d. G. z. B. Zöllmersdf. Giessmannsd.!

**Chelidonium majus** L. Schöllkraut. 5—10. Grüne, Schutt, gemein.

## 5. Fam. Fumariaceae D.C.

**Corydalis cava** Schweig. Lerchensporn. 4,5. Wz. knolle z. St. gest. hoch. Lu. Gebüsch zw. den Gärten im N. unter Corylus avell. von Schulsnaben gefunden 1881.

*C. intermedia* Mérat. 3—5. Wz. knolle dick. \*Gebüsch vor der Drauschemühle bei Bornsd. Kr. An der Berste von dieser Mühle bis Bornsd. überall unter Gebüsch!

**Fumaria officinalis** L. Gemeiner Erdrauch. 5—10. Fr. nabelig eingebrückt. Bebautes Land, gemein.

*F. Vaillantii* Loisl. 6,7. Fr. fast kugelförmig, nicht eingebrückt. Cahnsdf. hinter der Ziegelei!

## 6. Fam. Cruciferae Juss.

(Scht. = Schote od. Schötchen).

**Nasturtium** R. Br. Brunnenkresse.

1. *N. fontanum* Asch. 5—9. St. weiß. Scheint i. G. zu fehlen.

## 2. St. gelb.

*N. amphibium* R.Br. 5—7. St. 2—4 mal kürzer als ihr St. An Ufern, in Gräben, gemein.

*N. silvestre* R. Br. 5—8. St. etwa so lang als ihr St. Kr. b. von doppelter St. Länge. An feuchten O. häufig.

*N. palustre* D.C. 6—8. St. w. v. Kr. b. höchstens von St. Länge. An ähnl. O. häufig, z. B. Lu. am Gohmarschen Fließ, Gräben der Bäterwiesen zw. Zöllmersdf. u. Giessmannsdf. \*Bornsdorfer Teiche A.

***Barbarea lyrata*** Asch. 5,6. Endknospen der unteren Stg. b. klein, Kr. b. doppelt so lang als b. St. Früchte O. nicht selten; An der Bäte! Zöllmersdf. Waltersdf. Gehren; Fresdf.!

***B. stricta*** Andr. 5,6. Endknospen groß, Kr. b. wenig länger als b. St. Lu. am Schützenhause Schw. An der Bäte; Fresdf. Grabenränder am Borchelt!

***Turritis glabra*** L. Turmkrant. 6,7. Gemüse, Hügel, ziemlich verbreitet: Lu. Prinzeßinnensteig; Cahnsdf. Wall! \*F. Drehna, Part A. Von da bis Bornsdf.!

***Arabis hirsuta*** Scop. 5—7. Stg. b. pfriemf. sitzend. Trockne Wiesen u. Gemüse zw. Lu. u. Fresdf. bis zum Borchelt! Cahnsdf. Zaakow!

***A. arenosa*** Scop. 5—7. Stg. b. fiederteilig, gestielt. Am Eisenbahndamm zw. Uckro u. Pitschen!

***Cardamine pratensis*** L. Wiesen Schaumkrant. 4—6. Stg. hoch, Stb.beutel gelb. Gemein auf feuchten Wiesen.

***C. amara*** L. Bitteres Schaumkrant. 5,6. Stg. marzig, Stb.beutel violett. An u. im Wasser nicht selten: Lu. am Gohmarschen Fließ; Giessmannsdf. Pelkwitz! Langengrassau Schw. Waltersdf. \*Weissagk am neuen Quell!

† ***Hesperis matronalis*** L. Nachviole. (Süddeutschland). 5,6. Berm. Lu. auf Feldern im R. Gossmar an der Kirchhofsmauer!

***Sisymbrium*** L. Raukensenf.

1. *S. thalianum* Gay u. Monnard. 4,5. (Oft im Herbst wieder). St. weiß. Gemein, namentlich im westl. Teile d. G. Lu. bei der Schanze! Cahnsdf. etc.

## 2. St. gelb.

*S. sophia* L. 5—10. St. 2—3fach gefiedert. Häufig an Wegen, Gebäuden.

*S. officinale* Scop. 5—10. St. fiederspaltig ob. buchtig gezähnt. An dñj. O. gemein.

***Alliaria officinalis*** Andr. Knoblauchshederich 5,6. Fresdf. Wall; Bornsdf. Dorfstraße; \*F. Drehna Part!



**Erysimum cheiranthoides** L. Schotendotter. 5—10. Schutt, Aeder, gemein.

**Brassica** L. Kohl.

1. Die oberen B. sitzend.

a. †**B. oleracea** L. (Küsten Westeuropas). 5, 6. Stb. faden sämtlich aufrecht. In zahlreichen Formen cultiviert.

b. Kürzere Stbf. absteigend, aufstrebend, Samen grubig-punktiert.

†**B. rapa** L. Rübsen. 4, 5 u. 7, 8. St. trauben während des Aufblühens flach, erste B. grasgrün, beha. Gebaut.

†**B. napus** L. Rapz. 4, 5 u. 7, 8. Traube während d. Aufblühens verlängert, schon erste B. blaubüchtig, glatt. Gebaut.

2. **B. nigra** Koch. Schwarzer Senf. 6—8. B. alle gestielt. Um Lu. Rbh.

**Sinapis arvensis** L. Fiederich. 6—8. B. ungleich buchtig gezähnt. Auf Aedern gemein.

†**S. alba** L. Weißer Senf. 6—8. B. fiederteilig. Zum Unterpflügen gebaut. Lu. Fresdf.!

**Diplotaxis muralis** D. C. 6—10. \*Lu. Auf Felsen im E. seit mehr als 30 Jahren eingebürgert, bis zum Fressdorfer Borchelt hin! Zahlreich 1880 zw. d. Nif. Kirche u. Knabenschule im Riez u. Steinpflaster Schw. Ebenso 1881!

**Alyssum calycinum** L. Steintraut. 5, 6. J. G. selten: Vor Wüstermarken an der Chaussee!

**Berteroa incana** D. C. Grautresse. 6—8. Um Lu. viel an Chausseerändern: \*Nach Riedebeck zu A. Nach Uckro u. Golssen zu!

**Erophila verna** E. Mey. Fangerblümchen. 3—6. Überall gemein.

†**Cochlearia armoracia** L. Meerrettich. 5—7. Gebaut u. verw. z. B. Lu. im N.

**Camelina microcarpa** Andr. 5—7. Stg. u. B. rauh. Fresdf. auf und an dem Borchelt!

**C. sativa** Crtz. Leindotter. 6, 7. Stg. u. B. ziemlich zahl. Vereinzelt d. d. G. unter Flachsa!

**Thlaspi arvense** L. Pfennigkraut. 4—6. Zerstreut auf Felsen u. in Gärten nördl. von Lu. u. bei Cahnsdf.! Bei F. Drehna viel!

**Teesdalea nudicaulis** R. Br. 4, 5. Kiefernwälder, sandige O. d. d. G. häufig, namentlich i. westl. Teile von Rüdingsdf. bis Waltersdf. u. Bornsdf.! \*Uckro A.

**Lepidium campestre** R. Br. Feldtresse. 5—8. Stg. b. pfeilf. umfassend, kurzha. \*Fresdf. auf u. an dem Borchelt!

**L. ruderales** L. Schutttresse. 5—8. Stg. b. nicht umfassend, zahl.

Auf Schutt, an Begräbern: Lu. an den Windmühlen! Auf dem Anger Schw.

**Capsella bursa pastoris** Mch. Hirtentäschelfraut. 3—10. Gemein.

**Coronopus squamatus** Asch. 5—8. \*Lu. an der Promenade, u. zwar an der Ecke des Hainweges u. am Wege nach der sog. Viehweide; \*Sandow, Dorfstraße!

**Neslea (Vogelia) paniculata** Desv. 6,7. Auf Feldern um Lu. Karche, Zaakow, Cahnسدf.! \*Fresdf. A. u. f. f. bis Beesdau nicht selten!

**Raphanistrum silvestre** Asch. Federich. 6—8. Lästiges Unkraut auf Aedern.

†**Raphanus sativus** L. (Nien). 5—10. Als Rettig und Radieschen cultiviert.

## 7. Fam. Cistaceae Dunal.

**Helianthemum guttatum** Mill. Getüpfeltes Sonnenröschen. 5—10. Stg. aufrecht, krautig. Wüstermarke, Auerbalg; zw. Krinitz u. Gr.-Mehssow Rbh.

**H. chamaecistus** Mill. Gemeines S. 5—10. Stg. niederliegend od. aufsteigend, halbstrauchig. Waltersdf. Kalkgruben; Gehren, Königsberg unweit des Teufelssteines!

## 8. Fam. Violaceae D.C.

**Viola Tourn.** Veilchen.

A. Ohne entwickelten Stengel.

1. Griffel hängig, Fr.stiele niebergestreckt.

**V. odorata** L. März=B. 3—5. Mit Ausläuferu, wohlriechend. Häufig!

**V. hirta** L. Rauhes B. 4,5. Ohne Ausl. St. geruchlos. Südl. von Cahnسدf. viel; \*Fresdf. Grabenränder am Dammweg nach Lu.! \*Weinberg bei F. Drehna A.

2. **V. palustris** L. Sumpf=B. 4,5. Griffel trompetenf., Fr.stiele aufrecht. Lu. an der Fressdorfer Bahnfahrt; Wierigsdf. Sumpfwiesen! \*Langengrassau, Erleubrod Kr. \*Bw. Wanninchen u. Stiebsd.!

B. Mit deutlichem Stg. (**V. mirabilis** b. ersten Ausblühen stengellos.)

1. St. einfarbig violett, die mittleren St.b. seitlich absteigend.

a. Stg. aufrecht.

**V. mirabilis** L. 4—6. Stg. u. St.bl. einreihig beha. Weisagk Rbh.

- V. *persicifolia* Schk. var. *stagnina* Kit. 5, 6. Stg. u. St. fl. zahl. Torfstiche u. Wiesen zw. Lu. u. \*Wittmannsd. \*Gossmar u. Fresdf. A. Diesseit \*Beesdau, östl. der Straße sehr viel A.
- b. St. niederliegend od. aufstrebend.
- V. *canina* L. Hundsb. 5, 6. St. stumpflich, länger als breit. Häufig.
- V. *silvatica* Fr. Waldsb. 4—6. St. kurz zugespitzt, fast so lang als breit. Schattige Gebüsche: Waltersdf. Weinberg bei F. Drehna! var. c) *arenaria* D.C. St. dünnfilzig. Weissagker Rastgruben A.
2. V. *tricolor* L. Stiefmütterchen. 4—10. St. mehrfarbig od. gelb, die 4 oberen Krb. aufwärts gerichtet. Brachfelder u. gem.

## 9. Fam. Droseraceae D.C.

- Drosera rotundifolia** L. Rundblättriger Sonnentau. 6—8. St. fast kreisrund. \*An den Bornsdorfer Teichen A. Torfstiche bei Wanninchen; Gr. Teich bei Pademagk; Teich bei Presenchen; F. Drehna, Sandteich!
- D. *intermedia* Hayne. Mittlerer S. 6—8. St. vertehrt eig. teifg. In d. Regel weniger zahlreich als die v. N. aber mit ihr bei \*Bornsd. u. am \*Sandteich A. An letzterem auf der Süd.-Ostseite vorwiegend! \*Torfstiche zw. Wanninchen u. Stiebsdf. A. An den Teichen u. in den Torfsümpfen zw. Wanninchen, Presenchen u. Pademagk!
- Parnassia palustris** L. Herzblatt. 6—9. Feuchte Wiesen, d. d. G. häufig.

## 10. Fam. Polygalaceae Juss.

### **Polygala** L. Kreuzblume.

1. Seitenerven der Flügel an der Spitze durch eine schiefe Ader mit dem mittleren verbunden.
- P. *vulgaris* L. 6—8. Oberste Deckb. kürzer als die St. fl. Auf Grasplätzen d. d. G. häufig.
- var. *oxyptera* Rchb. Flügel spitz, länger, aber schmaler als die Kapfel. \*Drehnaer Weinberg in allen 3 Farben blühend A.
- P. *comosa* Schk. 5—7. Oberste Deckb. die St. fl. schopfartig überragend. D. d. G. kaum seltner als v. \*Vor Wittmannsd. (var. *poecilantha* Ble.) Ktz. Wiesen vor \*Beesdau; \*F. Drehna, Waldwiesen u. Weinberg A. Zw. Bornsd. u. Weissagk auf Wiesen u. Waldrändern!

2. *P. amara* L. 5,6. Seitennerven d. Flügel an b. Sp. nicht mit dem mittleren verbunden. Auf trocknen Wiesen an mehreren O. um Lu. bei Langengrassau; F. Drehna; Wanninchen Rbh.

## 11. Fam. Silenaceae D.C.

**Gypsophila muralis** L. Gipskraut. 7—10. \*Uckro, viel A. Ebenso auf den Feldern um Lu. Karche, Zaakow, Cahnsdf.!

**Tunica prolifera** Scop. Sprossende Nelke. 7,8. Wüstermarke, an der Chaussee nach Langengrassau!

**Dianthus** L. Nelke.

1. Blüten wenigstens zu 2 in einem Köpfchen ob. Büschel.

*D. carthusianorum* L. Karthäuser = N. 5—9. Hüll- u. Röhrenschuppen lederig, Stg. kah. Am Wege von Görlsd. nach Wanninchen! \*F. Drehna, Weinberg, viel A.

*D. armeria* L. Büschel = N. 7,8. Hüll- u. Röhrenschuppen krautig, Stg. weichha. \*Cahnsdf. Wall A. Lu. Prinzessinnensteig!

2. Blüten einzeln ob. rispig, langgestielt.

*D. deltoides* L. Blutströpfchen. 6—9. Rbh. vorn gezähnt. Trockne Wiesen, Waldränder, häufig.

*D. superbus* L. Pracht-Feder = N. 7,8. Rbh. fiederförmig eingeschnitten. Bei Casel häufig Rbh.

†**Saponaria officinalis** L. Seifenkraut. 7,8. In Gärten gezogen u. verw. z. B. Lu. Schw.

**Vaccaria segetalis** Gke. Ruhnelke. 6—8. Bei Wierigsdf. Fresdf. Frankendf. Rbh.

**Viscaria viscosa** Asch. Pechnelke. 5,6. \*Schlucht bei Wüstermarke M. \*F. Drehna, Weinberg A. Bornsd. Höhe im W. des Parks!

**Silene** L. Leimkraut, Taubentropf.

1. Schlundschuppen fehlen.

*S. venosa* Asch. (= *S. inflata* Sm.) 7,8. Röh. aufgeblasen, krugfg. Blatte d. Blkr. zweiteilig. Nicht selten, z. B. Cahnsdf. Frankendf. Fresdf. am Vordelt!

*S. otites* Sm. 5—8. Röh. nicht aufgeblasen, Blatte der Blkr. ungeteilt. Waltersdf. in den Kalkgruben viel; bewaldeter Höhenzug von Gebren bis Babben!

2. Mit Schlundschuppen.

a. Blatte der Rbh. zweiförmig.

*S. nutans* L. 6,7. Die g. Bl. kurz-staumig. St. schmutzig weiß. Langengrassau, auf Abhängen der Hölleberge; Geh-

ren, Kiefernwälder! F. Drehna, Höhe hinter der wil-  
sten Kirche; \*bei den Babbener Steinbrüchen!

S. chlorantha Ehrh. 7,8. Die g. Pfl. kah!, St. gelblich grün.  
Waltersdf. in den Kalfgruben! \*Zw. Gehren und  
W. Drehna Tsch.

†S. pendula L. 7—9. (Südeuropa). Zottig, oberwärts etwas  
bräutig, St. rosenrot. In Gärten cultiviert u. oft zahlreich  
verw. so Lu. Necker im S. 1881!

b. Platte der Kr.b. ungeteilt od. ausgerandet.

S. gallica L. 6,7. St. wenig zahlreich in traubenartigen Büscheln.  
Unter der Saat bei Wittmannsdf. 1881.

var. quinquevulnera L. Kr.b. i. d. Mitte mit blut-  
rotem Fleck. Bei Gossmar, Giessmannsdf. zw. Görlsdf.  
u. Wanninchen Rbh.

†S. armeria L. 7,8. (Südeuropa). St. zahlreich in büschlig ge-  
drungenen Trugbolben. Nördl. von Lu. an Zäunen verw.!

**Melandryum** Roehl. Lichtnelke.

1. St. zweithäufig, Narben 5.

M. album Gke. 5—9. St. weiß. Hügel, Begräber, gemein.

M. rubrum Gke. 5—9. St. rot. Bei F. Drehna Rbh.

2. M. noctiflorum Fr. 6—10. St. zwittrig, Narben 3. Lehmige  
Äder u. Gartenland um \*Lu. häufig, sowie auf den  
Fluren der nördl. u. östl. angrenzenden Dörfer von  
Karche bis Görlsdf.!

**Coronaria** flos cuculi A. Br. Fußblume. 5—7. Kr.b. zer-  
schl. Frucht O. gemein.

†C. tomentosa A. Br. Sammetnelke. (Südeuropa). 6,7. Kr.b. un-  
geteilt. In Gärten gezogen u. bei Lu. zuweilen verw. Schw.

**Agrostemma** githago L. Kornrade. 6,7. Unter Winterge-  
treide gemein.

## 12. Fam. Alsineae D.C.

**Spargula** L. Sparg.

1. S. arvensis L. 6—9. St. unterseits mit einer Furche. Auf  
Sandboden gemein, in der Form sativa Boen. als Fut-  
terkraut gebaut.

2. Blätter ohne Furche.

S. vernalis Willd. 4—6. Kr.b. sich bedend, Samensügel bräun-  
lich. Nicht selten: Kiefernwälder bei Ziokau u. Wie-  
rigsdf. um F. Drehna; \*Babben, bei den Stein-  
brüchen! \*Zw. Sandteich u. Gr. Mehssow Kr.

S. pentandra L. 4,5. Kr.b. sich nicht bedend, Sügel schnee-  
weiß. Fast überall Rbh. (?)

**Spergularia** Camb. Schuppenmiere.

1. *S. segetalis* (L.) Fenzl. 5—10. Stg. aufrecht, St. weiß.  
Unter der Saat bei Langengrassau Rbh.

2. Stg. niederliegend, St. rot.

*S. campestris* Asch. 5—10. S. beiderseits flach. Sandige  
D. häufig.

*S. salina* Presl. 5—10. S. fleischig. beiderseits gewölbt.

Auf salzhaltigen Tristen an einigen D. um Lu. Rbh.

**Alsine** viscosa Schreb. Klebrige Miere. 5—7. Pfl. drüsig beha.

\*Uckro viel; Paserin A.

*A. tenuifolia* Wahlb. Feinblättrige M. 6,7. Pfl. zahl. Hü-  
gel bei Krossen; Langengrassau Rbh.

**Sagina** L. Mäsfraut.

1. St. vierzählig, Staub. 4.

*S. procumbens* L. 4—10. S. zahl. Rbh. ohne Stachelspitze.  
Feuchte D. häufig, z. B. Cahnsdf. Langengrassau.

*S. apetala* L. 5—7. S. meist am Gr. gewimpert, Rbh. mit  
Stachelspitze. Auf Bruchäckern am Wege von Lu. nach Lüb-  
ben; Uckro bei der Ziegelscheune; Gahro, Heide Rbh.

2. *S. nodosa* Fenzl. 6—8. St. 5zählig, Staub. 10. Um Lu. häu-  
fig, z. B. am Gohmarischen Fließ; Cahnsdf.! \*Borns-  
dorfer Teiche A. Langengrassau!

**Moehringia** trinervia Clairv. 5,6. Gebüsch, Feden: Um  
Lu. häufig; ebenso bei Langengrassau; F. Drehna! \*Am  
Lorenzteich bei Pademagk A.

**Arenaria** serpyllifolia L. Sandfraut. 5—10. Nester, gemein.

**Holosteum** umbellatum L. Spurre. 3—5. Nester, Weg-  
ränder, gemein.

**Stellaria** L. Vogelmiere.

A. *S. holostea* L. 5. Kr.b. nur bis zur Mitte zweispaltig, Stg. kantig.  
Gebüsch, nicht selten: Lu. ander Däse zw. Zöllmersdf.  
u. Wierigsdf; Graben an der sogen. Burg; Busch bei  
Pademagk!

B. Kr.b. bis auf den Grund zweiteilig.

1. Kr.b. höchstens so lang als der Kelch.

a. Stg. rund, einreihig beha.

*S. media* Vill. 2—11. Gemeines Unkraut.

b. Stg. vierkantig.

*S. graminea* L. 5—7. Stg. ästig ausgebreitet, fadenfg. Ded.b.  
gewimpert. D. d. G. nicht selten, z. B. Langengrassau!

*S. uliginosa* Murr. 5—10. Stg. niederliegend od. stehend,  
Ded.b. nicht gewimpert. \*Sumpf an der Eisenbahn südl.  
Pickel A. Pelkwitz; Langengrassau!

*S. crassifolia* Ehrh. 5—7. Stg. kraff, Ded.b. krautig, B.

etwas fleischig. Auf sumpfigen Wiesen bei Waltersdf. Rbh.

2. *Ar.b.* von doppelter Röhrlänge.

*S. nemorum* L. 5,6. Stg. rund. Bei Uckro, nach Pitschen zu Rbh.

*S. glauca* With. 5,6. Stg. vierkantig. D. d. G. nicht selten: Lu. Torfwiesen: An der Bäte zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf; Cahnsdf. u. a. D!

**Moenchia erecta** Fl. Wett. 4—6. Sonnige Hügel: \*Uckro links vom Wege nach der Rochauer Pechhütte vor erreichter Höhe M. (Durch Abholzung des Birkenbestandes 1880 an d. D. fast vernichtet)! Am Fußsteige von Uckro nach Wüstermarke zw. den Lehmgruben der vorm. Ziegelei u. dem Walde 1881; \*Schlucht bei Wüstermarke!

**Cerastium Dill.** Spornkraut.

1. *C. arvense* L. 4,5. *Ar.b.* von doppelter Röhrlänge. Überall häufig.

2. *Ar.b.* nicht länger als der Kelch.

a. Ded.b. u. Röh.b. am Rande trodenhäutig.

*C. triviale* Lk. (= *C. caespitosum* Gil. 4—10. Stg. 10—45 cm. l. aufsteigend, an den unteren Knoten wurzelnd. Gemein.

*C. semidecandrum* L. 3—5. Stg. 3—15 cm. l. meist aufrecht, nie wurzelnd. Gemein.

b. *C. glomeratum* Thuill. 5—8. Ded.b. u. Röh.b. krautig, Röh. spitz mit Haarbüscheln. Schutt u. feuchte Acker, fast allg. Rbh.

**Malachium aquaticum** Fr. Weichkraut. 6—8. Feuchte, schattige D. häufig. N. St. Lu. am Schilfgenteich.

### 13. Fam. Elatinaceae Camb.

**Elatine Tünnel** L.

*E. triandra* Schk. 6—9. Röh. 2stellig, St. stengelb. An der O.seite des Borsndorfer großen Teichs 1878 A.

*E. hexandra* D.C. 6—8. St. dreizählig, gestielt. Mit voriger sparsam Loew.

### 14. Fam. Linaceae D.C.

†**Linum usitatissimum** L. Flachsk. (Südeuropa?) 6,7.

B. abwechselnd. Gebaut.

*L. catharticum* L. Purgierflachsk. 6—9. B. gegenständig. Häufig, namentlich auf Moorboden. N. St. Lu. Gräben der Chaussee nach Calau.

**Radiola multiflora** Asch. 7—9. Nester bei \*Uckro viel A.  
\*Bornsd. Mllr. Cahnsd. nach der Altenower Grenze hin, viel!

## 15. Fam. Malvaceae R.Br.

**Malva** L. Malve.

A. **M. alcea** L. 7—9. Obere St. einzeln, B. 5 u. 3teilig. \*Bornsd. an der wüsten Kirche M. F. Drehna, Weinberg Kn. mit c) excisa Rchb. (oberwärts rauhh.) am \*Fresdorfer Borchelt A.

B. Alle St. büschlig in den Achseln der 5 bis 7 lappigen B.

1. † **M. crispa** L. (Syrien). 7—10. B. am Rande wellig kraus. Riedebeck; Casel Rbh.

2. B. am Rande flach.

a. **M. silvestris** L. 6—10. Kr.b. 3mal so lang als der Rch. St. fl. nach dem Verblühen aufrecht. \*Nicht selten; z. B. Wierigsd.; Giessmannsd. Cahnsd. Frankend. Beesdau!

b. Kr.b. höchstens von doppelter Rch.länge, St. fl. n. d. Verbl. abwärts gebogen.

**M. neglecta** Wallr. (= **M. vulgaris** Fr.) 5—10. Kr.b. länger als d. Rch. Gemein.

**M. rotundifolia** L. 6—10. Kr.b. kaum so l. als der Rch. Um Lu. an einigen O. Rbh.

**Althaea officinalis** L. Eibisch. 7—8. Früchte Gemüse: Cahnsd. Wittmannsd. Rbh.

## 16. Fam. Tiliaceae Juss.

**Tilia ulmifolia** Scop. Winterlinde. 6, 7. B. beiderseits kahl, unterseits in den Acheraxeln rostgelb bärtig. Häufig angepflanzt.

T. **platyphylla** Scop. Sommerlinde. 6. B. von einfachen Ha. weichha. Häufig angepflanzt.

† T. **argentea** Desf. Silberlinde. (Ungarn). 7. B. unterseits nebst Zweigen u. Knospen von Sternha. weichfülig. Seltener angepflanzt; Cahnsd. Park; F. Drehna, Park!

## 17. Fam. Hypericaceae D.C.

**Hypericum** L. Johanniskraut, Hartheu.

1. Stg. 4kantig od. flügelig.

H. **tetrapterum** Fr. 7, 8. Stg. geflügelt, Rch.b. scharf zugespitzt. Nicht selten: \*An der Eisenbahn südl. Pickel A. An der Bäte zw. Zöllmersd. u. Wierigsd.; Lu. Gräben vor Cahnsd.; Langengrassau bei der Ziegelei; um F. Drehna!



- H. quadrangulum** L. 7—9. Stg. kantig, Rch.b. stumpf. Fast überall Rbh.
2. Stg. kantig.
- H. perforatum** L. 6—9. Stg. aufrecht, Rch.b. lanzettlich, spitz. Wälder, Tristen, häufig.
- H. humifusum** L. 6—9. Stg. niederliegend, Rch.b. länglich, stumpf, stachelspitzig. Fast d. d. G. häufig: Cahnسد! \*Jesder zw. Riedebeck, Beesdau u. Bornsd. A. Um F. Dreha!
3. Stg. stielrund, Rch.b. am Rande gefranst ob. drüsig bewimpert.
- a. **H. pulchrum** L. 6—9. Rch.b. stumpf, fein drüsig gefägt. Quer=balz bei Wüstermark Rbh.
- b. Rch.b. lanzettlich, spitz.
- H. montanum** L. 6—9. pfl. zahl. Fehlt i. der Nähe Lukaus, findet sich aber in der Stochauer Heide, z. B. \*beim neuen Forsthaus M.
- H. hirsutum** L. 6—8. pfl. beha. Langengrassau Rbh.

## 18. Fam. Aceraceae D.C.

### **Acer** L. Ahorn.

1. †**A. dasycarpum** Ehrh. (Nordamerika). 3,4. B. beim Ausschlagen rot. Um Lu. in schönen Exemplaren angepflanzt auf der S. seite der Promenade!
2. B. schon beim Ausschlagen grün, handf. klappig.
- a. **A. campestre** L. 5,6. Rappen ganzrandig, mittlerer stumpf klappig. Als Baum bei Zöllmersdf; strauchig in den Hecken um Lu. z. B. am grünen Weg. Scheinbar wild oder doch völlig verw. mit forlig geflügelten Nestern (var. *sulberosum*) auf dem Bäledamm zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf!
- b. Rappen zugespitzt.
- A. platanoides** L. 4,5. Rappen mit fast parallelen Seitenrändern u. linealischen Zähnen. Häufig angepflanzt.
- A. pseudoplatanus** L. 5,6. Rappen mit convergen Rändern, ungleich grobkörnig-gefägt. Häufig angepflanzt, z. B. Lu. Weg hinter d. Schützenhaufe.
- †**Negundo aceroides** Mch. (Nordamerika). 3,4. Angepflanzt: Chauffee nach Langengrassau.

## 19. Fam. Hippocastanaceae D.C.

- †**Aesculus hippocastanum** L. Kastanie. (Indien). 5,6. Häufig.

## 20. Fam. Vitaceae Juss.

- † **Ampelopsis** quinquefolia R. u. Sch. Wilder Wein.  
(Nordamerika). 7—9. häufig.
- † **Vitis** vinifera L. Wein. (Orient). 6—7. Cultiviert.

## 21. Fam. Geraniaceae. D.C.

**Geranium** L. Storchschnabel.

A. G. **Robertianum** L. 5—10. B. zusammengesetzt, 3 od. 5zählig, mit fiederspaltigen Lappen. Häufig. N. St. Lu. am Mülserthal.

B. B. einfach, 5—theilig od. spaltig.

1. Bl.fr. viel länger als der Ach. Pfl. ausdauernd.

a. G. **sanguineum** L. 6—8. St.fsl. einblütig. F. Drehna, Weinberg A.

b. St.fsl. zweiblütig, nach dem Verblühen niedergebogen.

\* St.fsl. mit rückwärts gerichteten, drüsenlosen Ha.

G. **palustre** L. 5—8. Frucht D. nicht selten: Paserin; Langengrassau; Waltersdorf; Görlsdorf; etc.

\*\* St.fsl. drüsig zottig, weiche.

† G. **pyrenaicum** L. 7—10. Kr.b. zweispaltig. \*F. Drehna, Part! A. Vollständig verw. nördl. von Lu. an den Heden der Bienenaden!

G. **pratense** L. 6—7. Kr.b. ungeteilt, blau. Bornsdorf Rhb. Ob wild?

2. Bl.fr. klein, nicht viel länger als der Ach. Pfl. einjährig.

a. G. **columbinum** L. 5—9. B.zipfel schmal, 1—2fach fiederspaltig. \*F. Drehna, Weinberg Kn. Bergen!

b. B. zipfel der eigentlichen B. breit, vorn dreilappig.

G. **molle** L. 5—9. Kapseln querrunzig. Häufig.

G. **pusillum** L. 5—9. Kapseln angebrüdt beha. B. vor.

**Erodium** cicutarium L'Heritier. 4—10. Häufig. N. St. Grüner Weg.

## 22. Fam. Balsaminaceae Rich.

**Impatiens** noli tangere L. Wilde Balsamine. 6—9. Fast in allen Erlengebüschen d. G. besonders zahlreich bei Paserin u. Uckro. Ferner Waltersdorf; Langengrassau; Gehren, bei der Andreas-Mühle; Görlsdorf! \*Bornsdorf M. \*Beesdau A.

## 23. Fam. Oxalidaceae D. C.

**Oxalis** L. Sauerflee.

- O. acetosella* L. 4—5. St. weiß mit purpurnen Atern. In feuchten Gebüschen nicht selten: Wittmannsdorf; Waltersdorf; \*Langengrassau, am Fuße der Hölleberge; \*G. Messow, Tannenbusch; \*Weissagk am neuen Quell A.  
 †*O. stricta* L. 6—10. (Nordamerika). St. gelb. Häufiges Unkraut.

## 24. Fam. Terebinthaceae D.C.

- †**Rhus typhina** L. Eßigbaum. (Nordamerika). 6—7. In Gärten angepflanzt.

## 25. Fam. Celastraceae R.Br.

- Euonymus europaea** L. Pfaffenhüttelein. 5—6. In Gebüschen u. Anlagen.

## 26. Fam. Rhamnaceae Juss.

- Rhamnus cathartica** L. Kreuzdorn. 5—6. Nicht selten: Langengrassau; Waltersdorf; Beesdau!  
**Frangula alnus** Mill. Faulbaum. 5—10. Ueberall häufig.

## 27. Fam. Papilionatae L.

- Sarothamnus scoparius** Koch. Besenpfriemen. 5,6. Häufig. N. St. \*Lu. Schanze A. Sehr viel bei Pelkwitz! u. vor \*Wüstermarke A.

**Genista** L. Ginster.

## 1. Stg. dornlos.

- G. pilosa* L. 5,6. St. seitenständig. Hülse beha. Häufig im B. u. S. d. G. Rodauer Heide u. Höhenzüge von \*Uckro A. über Langengrassau, Gehren bis Weissagk u. \*F. Drehna! Hier i. d. Forst u. auf d. Weinberg viel A.  
*G. tinctoria* L. 6—8. St. in endständigen Trauben, Hülse zahl. Cahnsdorf, Ball; Wanninchen; F. Drehna, zw. Part u. Weinberg!

## 2. Stg. dornig.

- G. germanica* L. 5,6. Junge Äste rauha. Nicht selten im B. u. S. d. G. Rodauer Heide; Langengrassau! \*Uckro; F. Drehna, Weinberg; Babbener Steinbrüche A.

*G. anglica* L. 5,6 Junge Nester zahl. Falkenberg Rbh.  
† *Cytisus laburnum* L. Goldregen. (Süddeutschland). 5,6.  
Gärten, angepflanzt.

† *Lupinus luteus* L. Gelbe Lupine. (Südeuropa). 6—9. Geb.

† *L. albus* L. Weiße L. (Südeuropa). 6—9. Seltener gebaut,  
auch in Gärten.

† *L. angustifolius* L. Blaue L. (Südeuropa). 5—9. Einzeln  
unter *L. luteus*.

*Ononis spinosa* L. Hauhechel. 5—9. Stg. 1 ob. 2reihig rauhsa.  
mit oft gezweigten Dornästen. Triften, Begränder, häufig.

*O. repens* L. 6—9. Stg. ringsum abstehend beha. mit einzelnen Dornen.  
Biel seltener, aber zerstreut d. d. G.: Langengrassau;  
Fresdorf; Bornsdorf; Stiebsdorf, am Wege nach Borns-  
dorf!

*O. arvensis* L. 7,8. Stg. ringsum rauhsa. drüsig, ohne Dornen.  
Eggsd. Kemlitzer Heide Rbh.

*Anthyllis vulneraria* L. (Wundflee. 5—10. Zuweilen ge-  
baut, in Görldsf. Falkenberg! Nicht selten wild, nament-  
lich \*Cahnsdorf H. an der Chaussee nach Calau; Fran-  
kendf. Fresdf. Wüstermarke! \*Langengrassau M.

*Medicago* L. Schneckenflee.

1. *M. lupulina* L. 5—10. Hülsen ohne Öffnung an einander schlie-  
ßend. Grasplätze, gemein.

2. Hülsenwindungen in d. Mitte eine Öffnung lassend od. fischlig.

† *M. sativa* L. Luzerne. (Südeuropa). 6—9. Hülsen 2—3 mal  
gewunden, St. dunkelblau bis violett. Gebaut.

*M. media* Pers. 6—10. Hüls. ein u. einhalb mal gewunden. St.  
gelblich, zuletzt bläulich. Cahnsdf. Wall!

*M. falcata* L. 6—10. Hüls. fischlig. St. hellgelb. Cahnsdf.  
Wall! F. Drehna, Weinberg Tr.

*Melilotus* Tourn. Steinflee.

1. St. gelb.

*M. altissimus* Thuill. 6—10. Hülsen angebrüdt kurzha., meist  
2samig. \*Graben der ehemal. Cahnsdorfer Viehweide A.

*M. officinalis* Desr. 6—10. Hülsen zahl. meist 1samig.  
Cahnsdf. am Wall. Görldsf. nordöstl. vom Gutshofe!

2. *M. albus* Desr. 6—9. St. weiß. Nicht selten: Cahnsdf.  
am Wall; Frankendorfer Moor! Fresdf. am Bor-  
schelt Schw. Görldsf.! F. Drehna, Weinberg!

*Trifolium* Tourn. Klee.

A. Die einzelnen St. ohne Ztbl. stehend.

1. Köpfchen alle endständig.

2. Kelchröhre außen weichha. od. zottig.

- T. pratense L. Rottfl. 5—9. Sch. 10nervig, B. chen fast ganzrandig. Häufig wild u. gebaut. Weiß am Chausseehause vor Duben Schw.
- T. alpestre L. 6—8. Sch. 10nervig, B. chen sehr fein gezähnt. \*Wiesen nördl. von Padomagk A.
- b. T. medium L. 6—8. Sch. röhre außen zahl. \*Uckro, Platz der alten Ziegelei A. Grabenränder nord- u. westl. von Wüstermarke; Wanninchen; westl. v. F. Drehna!
2. Köpfchen teils end- teils achselständig.
- T. arvense L. Mäuskeflee. 7—10. Köpfchen ohne Hülle, gestielt (wollig zottig). An trocknen D. häufig.
- T. striatum L. 5—7. Köpfchen mit Hülle sitzend. Gahro Rbh.
- B. T. fragiferum L. Erdbeerflee. 6—9. Die einzelnen St. mit Dedb. sehr kurz gestielt, Sch. aufgeblasen zweilippig. Nördl. u. östl. von Lu. sehr häufig. Ferner bei Karche; Zaakow; Cahnstdf. \*Bornstdf. an den Teichen!
- C. Die einzelnen St. mit Dedb. deutlich gestielt, Sch. weder aufgeblasen noch zweilippig.
1. T. montanum L. 5—7. Sch. zähne fast gleich. Nicht selten: Lu. Schanze; Karche; Cahnstdf. Fresdf. bes. am Borchelt; Görlstdf. bis \*F. Drehna, (Walbwiesen u. Weinberg) A.
2. Sch. zähne ungleich lang.
- a. Die oberen 2 Sch. zähne länger als die Sch. röhre.
- T. repens L. Weißflee 5—9. Stg. wurzelnd, Köpfchen länger gestielt als die B. Gemein, auch angezät.
- T. hybridum L. 5—9. Stg. aufsteigend, röhrig, Köpfchen kürzer gestielt als die B. Lu. Wäfwiesen zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf. Fresdf. F. Drehna, hinter dem Park; \*Wüstermarke, an der Chaussee nach Schlieben; Paserin, unweit des Bahndammes!
- b. Die 2 oberen Sch. zähne kürzer als die Sch. röhre.
- \* Fahne zusammengefaltet, nicht so furcht, Köpfchen loderbütig.
- T. filiforme L. 6—8. D. d. G. häufig.
- \*\* Fahne nach vorn löffelartig erweitert, Köpfchen dichtblütig.
- T. agrarium L. 6—9. Alle B. chen sehr kurz gestielt. Cahnstdf. an der Chaussee nach Lübben Schw. am Dorfe! zw. F. Drehna u. Stiebsdf.!
- T. procumbens L. 5—9. Mittleres B. chen doppelt so l. gest. Gemein.
- Lotus** L. Schoten- oder Hornflee.
- L. corniculatus L. 5—7. Stg. nicht hohl. Wiesen, gemein.
- L. uliginosus Schrk. 6—8. Stg. hohl, größer. An jumpfigen D. nicht selten, z. B. Lu. hinter dem Schützenhause;

Cahnsdf. Fresdf. Waltersdf. bei der Andreaszmühle;  
Langengrassau; F. Drehna!

† **Amorpha fruticosa** L. (Nordamerika). 6. Häufig ange-  
pflanzt.

† **Colutea arborescens** L. Knallschote. (Süddeutschland). 6,7.  
Angepflanzt in Gärten.

† **Robinia pseudacacia** L. Akazie. (Nordamerika). 5,6. An-  
gepflanzt.

† **Caragana arborescens** L. Erbsenbaum. (Südrußland). 5.  
Angepflanzt.

**Astragalus** L. Traganth.

**A. glycyphyllus** L. 5—6. St. gelblich weiß, Hülsen laßl.  
Cahnsdf. Wall! Riedebeck, Kirchhof Tsch.

**A. arenarius** L. 6—8. St. rot, Hse. grau beha. Kreblitz,  
Ziekau, Casel Rbh.

**Coronilla varia** L. Kronenwide. 6—9. Lu. Weissagk Rbh.

**Ornithopus perpusillus** L. 5—7. Sch. röhre 3 mal länger als die  
rissg. Zähne. Nicht selten: \*Uchro häufig A. Gehren; Wan-  
nichen u. a. O.!

† **O. sativus** Brotero. Serradella. (Südeuropa). 6—8. Sch.  
röhre wenig länger als die pfriemfg. Zähne. Gebaut.

**Vicia** L. Wiede.

**A. B.** mit Stachelspitze endend.

**V. lathyroides** L. 4—6. Pfl. klein, niederliegend, St. purpurn.  
Lu. Thongruben nach Wittmannsd. zu; \*an der Chauf-  
see nach Idro; Schanze! Zw. Wierigsd. u. Giess-  
mannsd. westl. von der Chaussee!

† **V. faba** L. Saubohne. Pfl. groß, aufrecht, St. weiß. Gebaut.

**B.** Mit einer oft geteilten Widelkrante endend.

1. Griffel unterhalb der Spitze auf der äußeren Seite bärtig.

a. St. in Trauben.

\* Trauben reichblütig, Länggestielt.

**V. cracca** L. Vogelwiede 6—8. Trb. dichtblütig, länger als  
b. F. Gemein.

**V. dumetorum** L. 6—8. Trb. 5—6 bltg., etwa so l. als b. B.  
F. Drehna, Weinbg. Rbh.

**V. cassubica** L. Trb. lockerbltg., kürzer als b. F. \*F. Drehna,  
Weinbg A.

\*\* **V. sepium** L. Trb. 2—5 bltg. kurz gestielt. Lu. hin u. wieder  
in Gebüsch, z. B. am Stadtgraben Schw.

b. St. einzeln od. zu 2 in den F. achseln.

† **V. sativa** L. 5—7. Futterwiede. Hülsen bei der Reife braun,  
kaumig. Gebaut.

- V. angustifolia* Rth. Hülsen bei d. Reife schwarz, kahl D. d. G. häufig.
2. Offn. unterhalb der Narbe gleichmäßig fein beha. a. d. Spitze kahl. (*Ervum Tourn*).
- V. hirsuta* L. 5—8. Bohnen 8—10 paarig, Achsähne so lang als die Achsröhre, (Hüllf. 2samig.) Nieder, Gebüsch, gemein.
- V. tetrasperma* Mch. 5—7. Bohnen 3—8 paarig, Achsähne kürzer als d. Achsröhre, Hüllf. 4f. Waltersd! Wüstermark M.
- †*Pisum sativum* L. Erbse. 5—7. Kultiviert.
- Lathyrus* L. Platterbse.
1. Bstiele mit Widelfranke endend.
- a. Stg. ungeflügelt, kantig.
- L. tuberosus* L. 6—8. Pfl. kahl, St. purpurn. Lu. Felder nördl. vom Prinzessinnensteig; \*Cahnsd. unweit der Chaussee nach Galau!
- L. pratensis* L. 6,7. Pfl. weichha. St. gelb. Häufig, z. B. Cahnsd.
- b. Stg. geflügelt.
- L. paluster* L. 6—8. Bstl. nicht geflügelt, Achsähne gewimpert. Lu. Wiesen am Gokmarschen Fließ; Fresd. in der Gegend des Borchelt!
- L. silvester* L. 7,8. Bstl. geflügelt, Achsähne begrannt. An Gesträuch Rbh.
2. Bstl. mit einfacher Stachelspitze endend. (*Orobus Tourn*).
- L. montanus* Bernh. 4—6. Stg. geflügelt. Langengrassau, Höllenberge; Falkenberg! \*Uckro; \*Drehnaer Weinberg A.
- L. niger* Wimm. 6,7. Stg. ungeflügelt. F. Drehna, Nordseite des Weinbergs im Walde!
- †*Phaseolus vulgaris* L. Bohne. (Ostindien). 6—9. Gebaut.

## 28. Fam. Caesalpinaceae R.Br.

- †*Gleditsia triacantha* L. Christusdorn. (Nordamerika). 6,7. F. Drehna, Alleen hinter dem Park!

## 29. Fam. Amygdalaceae Juss.

- †*Amygdalus nana* L. (Südostdeutschland). 3—4. In Gärten angepflanzt.
- †*Persica vulgaris* Mill. Pfirsich. (Vorderasien). 3—4. desgl.
- Prunus* L.
- A. †*P. armeniaca* L. Aprikose. 3—4. Steinfrucht sammetha. Cult.

**B. Steinfrucht fahl.****1. Fr. bereift. (Pflaumen).****a. St. fil. feinstaumig.**†**P. domestica** L. Gemeine Pflaume. (Borderaßen). 4.

Zweige fahl, Fr. länglich. Gemein.

†**P. insiticia** L. 4—5. Zwg. staumig, Fr. kuglig. Cahnsdf. Wall Rbh.**b. P. spinosa** L. Schlehe. 4,5. St. fil. fahl. Nicht selten, z. B. in den Gebüsch der Bäterwiesen zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf! \*Schlucht bei Wüstermarke; \*F. Drehna, bei der wüsten Kirche u. am Weinberg A.**2. Fr. ohne Reif, mit kugligen Kernsteinen.****a. St. zu 2 od. doldig, mit den B. od. vor dens. erscheinend. (Kirschen).****P. cerasus** L. Saure Kirsche. (Borderaßen) 4,5. B. fack, fahl. Cultiviert.**P. avium** L. Süßkirsche. 4,5. B. etwas runzlig, unterseits staumig. Desgl.**b. St. traubig od. doldentraubig, nach d. B. erscheinend. (Traubenkirschen).****P. padus** L. 5. Trb. reichbtg., schlaff herabhängend. Häufig. im Lu. auf den Promenaden; Cahnsdf. im Park angepflanzt.†**P. Mahaleb** L. 5. (Süddeutschland). Doldentrb. 5—10 btg. Beesdau!**30. Fam. Rosaceae Juss.**†**Spiraea salicifolia** L. (Südosteuropa). 6,7. Halbwild Lu. Graben an der jogen. Burg!**Ulmia pentapetala** Gil. 6—8. Stg. bis oben beblättert,

Pfl. 60—130 cm. h. Nicht selten. R. St. Lu. am Stadtgraben.

**U. filipendula** A. Br. 6,7. Stg. oberwärts fast bloß. Pfl. 30—60 cm. h.

\*Weissagk H. \*F. Drehna, Weinberg A.

†**Kerria japonica** D. C. (Japan). 5. Bierstrauch in Gärten.**Geum urbanum** L. 5—7. St. aufrecht Ach. an d. Fr. zurückgeschlagen. Gebüsch, Feden, häufig.**G. rivale** L. 5,6. St. nickend, Fr. Ach. aufrecht. Nicht selten: Lu.

Wiesen am Gohmarschen Fließ; Beesdau; Bornsd. Bergen.

**Rubus** L.1. **R. saxatilis** L. 5,6. Stg. einfach, krautig. Lu. westl. vom Gohmarschen Fließ Tsch. Wittmannsd. nord-östl. vom Dorf! \*Erlenbruch westl. von Beesdau Kr.**2. Stg. ästig, strauchig.****a. R. idaeus** L. Himbeere. 5,6. Kr. b. aufrecht, Fr. rot. Gebüsch,



nicht selten, z. B. Waltersdf. vor der Andreas-Mühle.  
In Gärten cultiv.

- b. *Ar.b.* ausgebreitet, abstehend, *Fr.* schwärzlich. Brombeeren.  
*R. caesius* L. 7, 8. *Ar.* der *Fr.* anschließend, *bfc.* blau bereift. Gemein.  
*R. fruticosus* L. *Fr.* lch. zurückgeschlagen, *Fr.* glänzend. Gemein.  
 Außerdem werden angegeben als im Gebiete heimisch:  
*R. suberectus* Anders. Höllenbg. b. Langengrassau Kr.  
*R. myriacanthus* Focke? Uckro Kr.  
*R. nitidus* W. u. N. Rbh. ohne näheren St. O.  
*R. Menkei* W. u. N. Bei Krinitz Rbh.  
*R. dumetorum* W. u. N. Nicht selten. (Asch. Flora).

### **Fragaria Tourn. Erdbeere.**

1. *Fr.* lch. abstechend od. zurückgeschlagen.  
*F. vesca* L. Wald-E. 5, 6. *St.* stl. mit angebrückten od. aufrechten Blaumha. Wälder, Gebüsche, Hügel, häufig.  
*F. elatior* Ehrh. (= *F. moschata* Duchne). Zimmt-E. 5, 6. Auch d. *St.* st. wagrecht abstechend rauhsa. \**F.* Drehna, Weinberg A. Görtsdf. Part!  
 2. *F. collina* Ehrh. 5, 6. *Fr.* lch. aufrecht, der *Fr.* angebrückt. Uckro an den Höllenbergen!

**Comarum palustre** L. Blutauge. 6, 7. In Torfsümpfen d. d. G. häufig, namentlich südl. von Lu.! \*Bornsdorfer Teiche A.

### **Potentilla** L. Fingerfrau.

A. *B.* unpaarig gefiedert.

1. *P. rupestris* L. 5, 6. *St.* weiß, in loderen Dolbentrauben.  
 \*Schlucht bei Wüstermarke M. \**F.* Drehna, Weinberg!  
 2. *St.* gelb, einzeln.  
*P. anserina* L. 5—7. *Ar.b.* länger als d. *Ar.* Graspflanze, gemein.  
*P. supina* L. 6—9. *Ar.b.* kürzer als d. *Ar.* Cahnsdf. am Wege von Beesdau nach Bergen Rbh.  
 B. *B.* handförmig, 3—7zählig.  
 1. *P. alba* L. 5, 6. *St.* weiß. Höllenbg. bei Langengrassau u. \*Uckro!  
 2. *St.* gelb.  
 a. *Ar.* 3zählig 8, *Ar.b.* 4.  
*P. silvestris* Neck. *B.* sitzend, *Stg.* nicht wurzelnd. Häufig.  
*P. procumbens* Sibth. 6—8. *B.* gestielt (d. oberen sehr kurz).  
*Stg.* wurzelnd. \**F.* Drehna, Weinberg Kn.  
 b. *Ar.* 3zählig 10, *Ar.b.* 5.  
 \* *Stg.* kriechend, *St.* blattwinkelständig.  
*P. reptans* L. 6—8. Gemein.  
 \*\* *Stg.* aufrecht od. aufsteigend, *St.* endständig..

**SP. norvegica** L. 6,7. *B.* 3zählig. Lu. Wiesen am Gofsmarschen Fließ; zw. Fresdf. Frankendf. u. Görlsd. viel! \*Erlenbruch westl. v. Beesdau Kr. \*Bornsd. Großer Teich A.

**SS** *B.* (wenigstens die unteren) 5—7zählig.

**aa.** Stg. niederliegend, *B.* beiderseits grünlich.

**P. verna** L. 4,5. Stg. grün, Beha. kurz, aufrecht abstehend. Lu. Schanze, Chaussee nach Uckro; \*Weissagker Kalkgruben; \*Babben!

**P. opaca** L. 4—6. Stg. meist rot, Beha. lang, wagrecht abst. zottig. Lu. Chaussee u. Langengrassau, an den Mühlen! \*F. Drehna, Weinberg A. \*Weissagk, Kalkgruben Kr.

**bb.** Stg. aufrecht od. aufstrebend, *B.* unterseits weiß od. grauflzig.

**P. argentea** L. 6,7. Stg. nur flzig. *B.* oben am Rande umgerollt. Gemein.

**P. incana** Mnch. 4,5. Stg. u. *B.* flzig u. weichzottig. Nicht selten: Zaakow!

**Alchimilla arvensis** Scop. 5—10. *B.* handfg. 3—5spaltig. Auf Aedern von Cahnstd. bis Altenow, Frankendf. u. Fresdf. süd-östl. v. F. Drehna; Zaakow! \*Uckro A.

**A. vulgaris** L. 5—7. Untere *B.* nierenfg. 7—9 lappig. \*Fresdf. an der nach dem Borchelt führenden Dorfstraße! \*F. Drehna Pohle. \*Bornsd. bei der Drauschemühle Tsch.

**†Sanguisorba minor** Scop. Wiesenknopf. 5—7. F. \*Drehna, Pars (eingeschleppt)!

**Agrimonia eupatoria** L. Odermennig. 6—9. Röhre dicht rauhha. bei d. Reife mit tiefen, bis fast zum Grunde reichenden Furchen. Fast d. d. G. häufig. R. St. Lu. Chaussee dem Sandower Kirchhof gegenüber! Langengrassau viel; ebenso um F. Drehna u. a. a. O.!

**A. odorata** Mill. 6—8. Röhre locker beha. mit seichten, nur bis zur Mitte reichenden Furchen. Bornsd. an den Teichen R.

**Rosa** L. Rose.

**A.** Fr. oben in der Scheinfr. mit Stl. von der Länge der Fr. oben.

1. **R. canina** L. 6. *B.* oben unterseits lahl. Häufig.

2. *B.* unterseits drüsig od. flzig.

**a. R. pomifera** Herm. 6. Fr. b. am Rande drüsig gewimpert. Rbh. .

b. Fr. b. nicht drüsig gewimpert, (Fr. aufrecht).

**R. rubiginosa** L. 6. *B.* oben unterseits drüsig punktiert, flebrig. Lu. Schanze u. an der Promenade Schw. zw. Langengrassau u. Wüstermark!

**R. tomentosa** Sm. 6. *B.* oben unterf. dicht grauflzig. Zerstreut

d. d. G.: Vor Wittmannsd. Dammweg nach Fresdf.  
u. a. D.

B. †R. *cinnamomea* L. 5,6. (Mitteldeutschland). Fr. den Länger als ihre St. Lu. Kirchhof halbwild!

### 31. Fam. Pomariae Lindl.

**Crataegus** L. Weißdorn.

*C. monogyna* Jacq. 5,6. St. st. zottig, Ach. z. sp. zurückgeschlagen, Fr. kuglig. Häufig angepflanzt. Scheinbar wild i. d. \*Schlucht bei Wüstermarke u. auf d. \*Weinberg bei F. Drehna A.

*C. oxyacantha* L. 5,6. St. stiele kahl, Ach. z. sp. abstehend, Fr. oval. Wie vor. aber bei Lu. seltener angepflanzt. \*Schlucht bei Wüstermarke A. Vor Zauche!

†*Cydonia vulgaris* Willd. Quitte. (Orient). 5,6. \*F. Drehna, Weinberg A.

**Pirus communis** L. Birnbaum. 4,5. Cultiviert.

*P. malus* L. Apfelbaum. 5. beagl.

**Sorbus** (*Pirus*) *aucuparia* L. Eberesche. 5,6. Wild u. angepflanzt d. d. G. nicht selten.

### 32. Fam. Onagraceae Juss.

**Epilobium** Dillen. Weidenröschen.

A. Untere B. gegenständig.

1. Stg. stielrund, ohne erhabene Linien.

a. *E. palustre* L. 7,8. Narbe ungeteilt, keulensg. An sumpfigen D. überall häufig. N. St. Lu. Am Gogmarischen Fließ!

b. Narbe teilig.

\* B. weiter umfassend, noch herablaufend.

*E. parviflorum* Schreb. 6—9. B. sitzend. Lu. am Gogmarischen Fließ. Gräben zw. Lu. u. Fresdf; Waltersd; Gehren!

*E. montanum* L. 6—9. Untere B. kurz gestielt. Zerstreut d. d. G. Bei Langengrassau u. Wüstermarke häufig!

\*\* B. stengelumfassend, St. groß (3 cm).

*E. hirsutum* L. 6—9. N. d. Berste Rbh.

2. Stg. durch 2—4 herablaufende Linien kantig.

a. *E. roseum* Schreb. 7,8. B. beiderseits verschmälert, alle gestielt. Nicht selten: Lu. Am Stadtgraben, am Müllerbad, Graben bei der Badeanstalt! An der Bäre zw. Wierigsd. u. Karche! \*Zw. Uckro u. Pitschen, Sumpf am Eisenbahndamm A. Sümpfe süd-östl. v. Waltersd!

b. B. aus abgerundeter Basis verschmälert, die mittleren sitzend.

**E. tetragonum** auct. (= *E. adnatum* Grieseb.) 6—8. St. vor dem Aufblühen aufrecht. \*Lu. Bäfedamm zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf; Waltersdf. Graben vor der Andreaszmühle!

**E. obscurum** Rchb. (= *E. chordorrhizum* Fr.) 7—8. St. vor dem Aufblühen niederb. \*Uckro, Graben zw. der alten Ziegelei u. den Höllebergen A.

**B. E. spicatum** Lmk. (= *E. angustifolium* L.) 7—9. B. sämtlich abwechselnd. \*Langengrassau am Bahndamm A. In den Höllebergen! Waltersdf. Schw. Bei Alt-Sorgefeld!

**Oenothera biennis** L. Nachtfarbe. 6—9. Zöllmersdf. an der Chaussee, viel! Pelkwitz Schw. Weissagk!

**Isnardia palustris** L. 7,8. An u. in Gräben bei Görlsd. Terpt, Düben Rbh.

**Circaea lutetiana** L. Hexenfraut. 7,8. Trauben ohne Deckb. Fehlt in der Umgebung von Lu. dagegen zahlreich süd-östl. von F. Drehna in den Erlengebüschen bei der Scharfrichterei!

**C. alpina** L. 6—8. Treben mit kleinen pfriemfg. Deckb. Erlengebüsche zw. Paserin u. Pitschen! \*Am Fuß der Hölleberge bei Uckro u. Langengrassau sehr zahlreich! \*Bornsd. M.

**Trapa natans** L. 7,8. Lu. im Stadtgraben Rbh. Ausgerottet!

### 33. Fam. Halorrhagidaceae R.Br.

**Myriophyllum verticillatum** L. Tausendblatt. 6—8. Alle Deckb. fiederteilig. In allen Gräben u. Sümpfen d. d. G. häufig, namentlich in den Torfmooren südl. von Lu. u. im Stadtgraben. Var. *pinnatifidum* Wallr. (mit laubartigen Deckb.) in den Torfsümpfen zw. Lu. Wittmaunsdf. u. Fresdf. nicht selten, am zahlreichsten westl. v. Gohmarichen Fließ!

**M. spicatum** L. 7—9. Obere Deckb. ungeteilt. Lu. mit vor. doch viel weniger häufig!

### 34. Fam. Hippuridaceae Lk.

**Hippuris vulgaris** L. Tannenwedel. 7,8. \*In den Gräben u. Lachen der ehemaligen Viehweide zw. Cahnsdf. u. Frankendf., sowie zahlreich in denen des Frankendorfer Moores!

### 35. Fam. Callitrichaceae Lk.

**Callitriche stagnalis** Scop. Wasserstern. 5—10. Alle B. vertehrt eifg. Fr. breit gestülpt. \*Weissagk, Quellgraben bei der kleinen Mühle A.

*C. verna* L. 4—10. untere B. linealisch, Jr. gefielt. D. d. G. in Gewässern häufig.

### 36. Fam. Ceratophyllaceae Gray.

*Ceratophyllum demersum* L. Hornblatt. 7,8. Hier u. da Rbh.

### 37. Fam. Lythraceae Juss.

*Lythrum salicaria* L. Weiderich. 7—10. St. eine endständige Ähre bildend Feuchte Gebüsche, Gräben, d. d. G. gemein.

*L. hyssopifolia* L. 7,8. St. einzeln, achselständig. \*Bornsd. am großen Teich, viel A.

*Peplis portula* L. 7—10. Lu. Vertiefungen des Angers jüdl. der Chaussee nach Uckro Schw. \*Piefelskeute beim Forsthaufe der Rodauer Heide M. \*Am Bornsdorfer großen Teich A.

### 38. Fam. Philadelphaceae Don.

†*Philadelphus coronarius* L. Jasmin. (Südeuropa). 5,6. Zierstrauch.

### 39. Fam. Cucurbitaceae Juss.

†*Cucurbita pepo* L. Kürbis. 6—9. Jr. glatt. Cultiviert.

†*C. melopepo* L. Türkenbund. 6—9. Jr. abgeplattet mit hödrigem Rande. Desgl.

*Cucumis sativus* L. Gurke. (Ostindien). 5—9. B. mit spizen Eden, Jr. langgestreckt. Cultiviert.

*C. melo* L. Melone. (Ostindien). 5—9. B. herzf. flappig mit abgerundeten Lappen, Jr. runblich eifg. Cultiviert.

*Bryonia alba* L. Jaunrübe. 6—8. Hecken u. Zäune, häufig. R. St. Sandow.

†*Sicyus angulatus* L. Haargurke. 6—9. (Nordamerika). Zierpflanze, verw. Lu. in den Hecken der Promenade beim Eisbaufe Schw.

### 40. Fam. Portulacaceae Juss.

*Montia minor* Gmel. 5. \*Giessmannsd. Felder am Wege nach Schollen, so wie am Wierigsdorfer Kirchsteig! \*Jm. Riedebeck u. Grünswalde Tsch. \*Jm. Riedebeck u. Bornsd. an der Chaussee Kr.

## 41. Fam. Paronychiaceae St.Hilaire.

**Corrigiola litoralis** L. Strandling. 6—9. Langengrassau, bei der Ziegelei!

**Herniaria glabra** L. Bruchkraut. 7—10. An trocknen O. häufig.

**Ilcebrum verticillatum** L. Anorpelkraut. 6—10. Im G. ziemlich verbreitet: \*Cahnsdf. Nieder an der Altenower Grenze! \*Gossmar auf allen Seiten: nach Wittmannsdf. zu Tsch. \*Nieder an der Bessdauer Grenze A. Zw. Boesdau u. Bergen viel! \*Bornsd. am Großen Teich Dumas. Gr. Mehssow, ganze Felder überziehend!

## 42. Fam. Scleranthaceae Lk.

**Scleranthus** L. Anänel.

**S. annuus** L. 6—10. Achselpfel eifg. spitz mit sehr schmalem weißlichen Rande. Sandiger Boden gemein.

**S. perennis** L. 5—10. Achselpfel länglich stumpf mit breitem weißen Rande. D. d. G. nicht selten, doch weniger häufig als vor. Art!

## 43. Fam. Crassulaceae D.C.

**Sedum** L.

**A. S. maximum**. Sut. Fetthenne. 8,9. B. breit, flach. An sonnigen O. nicht selten. Sehr zahlreich bei Zöllmersdf. an der Chaussee!

**B. B. im Querschnitt rundlich. Mauerpfeffer.**

1. **S. villosus** L. 6,7. St. rosenrot, Pf. mit übrigen roten Drüsen. Auf sumpfigen Wiesen bei Bornsd. Rbh.

2. **S. album** L. (Mitteldeutschland). 6—9. St. weiß, Pf. fast. Berv. Frankend. am Kirchhof (Anaben).

3. **B. gelb, blühende Stg. mit zerstreuten, ausbauende m. ziegelbachigen B.**

a. **S. acre** L. 6,7. B. kurz eifg. mit abgestumpfter Basis sitzend.

b. **B. linealisch, am Grunde gelbst.**

**S. mite** Gil. (= *S. sexangulare* auct.) 6,7. B. u. Achselpfel stumpf. D. d. G. seltener als v. A.

**S. reflexum** L. 6,7. B. mit kurzer Stachelspitze, Achselpfel spitz. Auf trocknen Hügelu nicht selten Rbh.

**Sempervivum tectorum** L. Hauslauch. (Süddeutschland).

7,8. Berv. auf Dächern, Kirchhöfen.

## 44. Fam. Grossulariaceae D.C.

**Ribes** L.

**A. R. grossularia** L. Stachelbeere. 4. Stg. mit Stacheln. Cultiv.

B. Stg. ohne Stacheln.

1. † *R. aureum* Pursh. (Nordamerika). 4,5. R. langröhrig, gelb. Bierstrauch.

2. R. röhre beckenf. bis glockenf.

a. *R. alpinum* L. 4,5. Trauben brüsig beha. aufrecht. Lu. Paserin Rbh.

b. Trauben hängend ob. nidenb.

*R. rubrum* L. Johannisbeere. 4,5. R. zahl. Cultiv.

*R. nigrum* L. Malbeere. 4,5. R. flaumig, brüsig punktiert. Bei Lu. nicht selten in den Gebüschen der Promenaden.

## 45. Fam. Saxifragaceae Vent.

**Saxifraga** L. Steinbrech.

*S. tridactylitis* L. 4—6. Pfl. bis 15 cm. hoch, untere B. spatelf. Im G. nicht selten. Weite Strecken überziehend westl. der Bäte zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf., sowie am Borchst bei Fresdf. N. St. nördl. v. Lu. Felder an der Berste!

*S. granulata* L. 5,6. Pfl. bis 30 cm. h. untere B. nierenf., die untersten in ihren Achseln Zwiebeln tragend. D. d. G. häufig.

**Chrysosplenium alternifolium** L. Milzkrant. 3—5. An feuchten D. d. d. G. nicht selten: westl. v. Wierigsdf. bei Pelkwitz; Paserin; Uckro; Langengrassau, am Fuß der Höllenberge viel! \*Bornsd. Drausche=Mühle u. an den Teichen weite Strecken überziehend A.

## 46. Fam. Umbelliferae Juss.

**Hydrocotyle vulgaris** L. Wassernabel. 7—10. In allen Mooren u. auf jumpfigen Waldstellen d. G. häufig.

**Sanicula europaea** L. Sanikel. 5,6. Süd-westl. von F. Drehna im Laubwald hinter der Försterei u. Ziegelei!

† **Astrantia major** L. 7,8. (Schon in Schlesien wild). In Gärten angepflanzt u. zuw. verw. z. B. Terpt!

**Eryngium planum** L. 7,8. 1880 nord-östl. von Lu. am Fußsteig nach dem Zaakower Wege von Schw. gefunden, auch 1881 noch blühend von mir beobachtet, aber darauf durch botanisierende Schüler wahrscheinlich ausgerottet!

**Cicuta virosa** L. Wasserschiefing. 7,8. Um Lu. häufig z. B. Teich u. Gräben hinter dem Schützenhause, Gohmarisches Fließ.

**Apium graveolens** L. Sellerie. 7—10. Der Wurzel wegen gebaut.

**Petroselinum sativum** Hoffm. Petersilie. 6,7. Gebaut.

**Falcaria** sioides Asch. Sichelbolbe. 7—9. Im N. u. O. von Lu. auf u. an Aedern nicht selten, ebenso bei Schollen, Karche u. Cahnsdf!

**Aegopodium** podagraria L. Giersch. 6,7. Zäune, Gärten, gemein.

**Carum** carvi L. Kümmel. 5,6. D. d. G. nicht selten. N. St. Lu. Hainwiesen.

**Pimpinella** Riv. Biebernell.

*P. magna* L. 6—9. Stg. kantig gefurcht, Bl. an den oberen B. linealisch. Wierigsdf. Tsch. \*Cahnsdf. am Wall! Im Görlsdf. häufig, z. B. am Wege nach Wanninchen! Von hier bis \*F. Drehna! Hier auf dem Weinberg! auf Wiesen A. Beesdau im Part Schw. Langengrassauer Heide vor Alt-Sorgefeld!

*P. saxifraga* L. 7—10. Stg. rüchtrund, gestreift. Bl. an der Stg. b. fiederteilig. Gemein.

**Berula** angustifolia Koch. 7—9. In Gräben u. Bächen d. d. G. häufig, z. B. in der Bäre.

**Sium** latifolium L. Merk. 7,8. N. St. Lu. Gräben vor dem Hain! Auch sonst d. d. G. nicht selten, z. B. \*Bornsd. Leiche A.

**Oenanthe** L. Nebendolbe.

*O. fistulosa* L. 6—8. Endständige Dolbe 3strahlig. Stg. wenig ästig, weitröhrig. Um Lu. häufig, z. B. Gräben u. sumppige Stellen nördl. der Stadt u. am Wege nach Cahnsdorf; Pelkwitz!

*O. aquatica* Lmk. (= *Phellandrium* a. L.) 7,8. Dolben mehrstrahlig, Stg. ästig. Bei Lu. Gräben u. Sümpfe, gemein. N. St. Haingraben u. Berse! Viel bei Paserin! \*Bornsd. Gr. Leiche A.

**Aethusa** cynapium L. Hundspetersilie. 6—10. Gemeines Unkraut.

**Seseli** L. Sejel.

*S. hippomarathrum* L. 7—9. Folben 5—10strahlig. Bei Pitschen Rbh. (Asch. Flora.)

*S. annuum* L. 7—9. Endständige Dolben 20—30strig. \*Südl. von Cahnsdf. auf Grabenrändern, Aderrainen u. sehr zahlreich auf der Calauer Chaussee; \*an der Chaussee nach Zöllmersdf!

**Cnidium** venosum Koch. Brennolbe. 8,9. Nördl. u. nordöstl. von Cahnsdf. besonders zahlreich am Wäldchen unweit der Altenower Grenze!

**Silau** pratensis Bess. Silau. 6—9. Rings um Lu. nicht



selten. N. St. \*Graswege nördl. der Stadt u. hinter Sandow! Häufig bei \*Cahnsdf. u. \*Frankendf. (Vorchestwießen) A. Zaakow; zw. Uckro u. der Rochauer Pechhütte! *Meum athamanticum* Jacq. 5,6. Bei Weissagk Grassmann.

†*Levisticum paludapifolium* Asch. Liebstüdel. (Südeuropa). 7,8. Verm. F. Drehna, Weinberg Kretzschmar.

*Selinum carvifolia* L. Silge. 7—9. Laubwälder u. Wiesen, d. d. G. häufig. N. St. \*Lu. Wiesen am Gohmarischen Fließ; sehr viel bei Langengrassau am Fuß der Hölleberge u. im Görlsdorfer Busch; bei Beesdan! \*Vor Cahnsdf. u. Weinberg bei F. Drehna A.

*Angelica silvestris* L. 7—9. D. d. G. nicht selten: N. St. Lu. Wiesen am Gohmarischen Fließ; sehr viel südwestl. von Wierigsdf!

*Archangelica sativa* Bess. Engelwurz. 7,8. In Grassgärten der Dörfer Rbh.

*Peucedanum* L. Saarsirang.

*P. corvaria* Cuss. 8,9. St. chen meergrün, unterseits blaß, die des Stg. klein. \*F. Drehna, Weinberg A.

*P. oreoselinum* Mnch. 7,8. St. chen glänzend, Verzweigungen des Stiels zurückgebogen. Viel bei Zöllmersdf. an der Chaussee nach Uckro; im Walde hinter Gehren; zw. Trebbinchen u. Weissagk! \*F. Drehna, Weinberg A.

*Thysselinum palustre* Hoffm. (= *Peucedanum* p. Mnch.) 7,8. D. d. G. nicht selten: N. St. Lu. am Stadtgraben u. am Gohmarischen Fließ; ferner im Hinterbusch bei Frosdf. u. Görlsdf! \*Bornslf. an den Teichen; \*F. Drehna, Wiesen A.

†*Anethum graveolens* L. Dill. (Südeuropa). 7—9. Gebaut u. verw.

*Ptastinaca sativa* L. Pastinak. 7—9. Gemein, zuw. lästiges Unkraut.

*Heracleum sphondylium* L. Bärenklau. 6—10. Wie vor.

*Laserpicium prutenicum* L. Hirschwurz. 7,8. Stg. fleisch. kantig. \*Am Wege von Uckro nach der Pechhütte! \*F. Drehna, Weinberg R.

*L. latifolium* L. Lajertraut. 7,8. Stg. lach, flachrund. Bei Weissagk; F. Drehna, nach Bergen zu; Gehren Rbh.

*Daucus carota* L. Mohrrübe. 6—10. Wild u. gebaut überall gemein.

*Torilis anthriscus* Gmel. Klettenskerbel. 6,7. Heden, Gebüsch, gemein.

*Anthriscus* Hoffm. Kerbel.

1. *A. vulgaris* Pers. (*Chaerophyllum anthriscus* Crtz.). 5,6. Fr. mit gekrümmten Borsten besetzt, Grffl. sehr kurz, Stg. kahl. Wohl fast in allen Dorfsstraßen d. G. z. B. Giessmannsd. Karche; Frankend. Fresd. \*Beesdau! \*F. Drehna A.

2. Fr. glatt, Grffl. länger als das Stempelpolster.

*A. silvestris* Hoffm. 5,6. Stg. unterwärts rauhs. Gebüsch, Hecken, gemein.

† *A. cerefolium* Hoffm. (Südeuropa). 4–6. Stg. oberhalb der Knoten flaumig. Als Küchengewächs gebaut u. zuw. verw.

*Chaerophyllum temulum* L. Rälberkropf. 5–7. Gebüsch, Hecken, gemein.

*Conium maculatum* L. Gefeckter Schierling. 6–10. Im G. ziemlich selten: Wierigsd. an der Chaussee! Schollen, Dorfsstraße; Görlsd. in Gärten Schw.

#### 47. Fam. Araliaceae Juss.

*Hedera helix* L. Ephen. 9,10. Zu Mauerbefeidungen cultiviert, die starken Stämme an der Luckauer Stadtmauer fast alljährlich blühend.

#### 48. Fam. Cornaceae D.C.

*Cornus* Tourn. Cornelle, Hornstrauch, Hartriegel.

1. † *C. mas* L. (Mitteldeutschland). 3,4. St. vor dem Ausbruch der B. erscheinend, Fr. rot. Lu. auf dem Kirchhof Schw.

2. St. nach dem Ausbruch der B. erscheinend.

*C. sanguinea* L. 5,6. Fr. schwarz, B. beiderseits grün. An-gepflanzt in den Promenaden um Lu.

*C. stolonifera* Mich. (*C. alba* auct.). (Nordamerika). 6. Fr. weiß, B. unterseits grauflzig. Häufig angepflanzt u. verw. So Lu. Graben an der sogen. Burg! \*F. Drehna, an der Sägemühle A.

#### 49. Fam. Loranthaceae Don.

*Viscum album* L. Mistel. 3,4. \*Gahroer Heide Kr. Ro- chauer Heide!

#### 50. Caprifoliaceae Juss.

*Adoxa moschatellina* L. Moschusstrauch. 4,5. \*Lu. an der

Bäfe, westl. von der Chaussee nach Wierigsdf! In Wierigsdf. zw. den Gärten Schw.

**Sambucus Tourn.** Hollunder.

1. *S. racemosa* L. 4,5. St. in eig. gelblich grünen Straußen, Beeren rot. In G. noch nicht bemerkt, doch zahlreich in den Blößen des Laubwaldes zw. Dobrilugk u. Kirchhain! Daher vielleicht noch i. G. zu finden.

2. St. in Erngolden, Beeren schwarz.

*S. ebulum* L. (Mitteldeutschland). 6—8. Stg. krautig. Lu. in Gärten Rbh.

*S. nigra* L. 6,7. Stg. holzig, martig. Wild u. angepflanzt nicht selten.

**Viburnum** L. Schneeball.

*V. opulus* L. 5,6. B. 3 ob. 5lappig, beiderseits grün. In Gebüsch: Lu. Graben an der Burg; Beesdau; F. Drehna!

†*V. lantana* L. In Bergwäldern heimisch. 5. B. elliptisch, ganz, unterseits, sternförmig. Angepflanzt, 3. B. Wittmannsd. Gebüsch an der Chaussee!

**Lonicera** L. Heckenkirchje.

1. Stamm windend.

†*L. caprifolium* L. Geißblatt. (Süddeutschland). 5,6. Obere B. verwachsen. Angepflanzt.

*L. periclymenum* D.C. 6—8. Alle B. getrennt. \*F. Drehna, Weinberg Kn.

2. †*L. tatarica* L. (Osteuropa). 5,6. Stamm aufrecht, St. paarweise. Angepflanzt u. verw., so Lu. Graben an der sog. Burg!

†**Symphoricarpus racemosus** Mich. Schneebeere. (Nordamerika). Massenhaft zur Bierde in u. um Lu. angepflanzt. *Linnaea borealis* Gronovius. 5—20. Juni. An einer Stelle d. Kemlitzer Seide Rbh.

51. Fam. Rubiaceae Juss.

*Sherardia arvensis* L. 6—10. \*Lu. im N. u. O. der Stadt; \*Cahnsdf. (sehr viel); Fresdf. Frankendf. \*Görlsd. bis \*F. Drehna! Hier auf dem \*Weinberge A.

**Asperula** L. Waldmeister.

1. *A. odorata* L. 5,6. Fr. mit steifen, harten Borsten besetzt. Überall in Gärten angefaßt u. zuw. verw., so Lu. an Heden der Promenade. Wird nach Rbh. bei Gahro.

2. Fr. unbehaart.

*A. cynanchica* L. 6—9. Ded. nachspitzig, nicht gewimpert. Bei Lu. Rbh.

*A. arvensis* L. 5,6. Dedb. borstig gewimpert. Bei Ziekau Rbh.

**Galium** L. Labkraut.

*A.* Trugbolben blattwinkelsständig, Stg. von Stacheln rauh.

1. *G. palustre* L. 5—9. St. meist zu 4, stumpf. An feuchten O. gemein.

2. St. zu 6—8, stachelspitzig.

a. *G. tricorne* With. 7—10. Fr. stiele zurückgekrümmt, Trugbolben 3btg. Cahnsd. Rbh.

b. Fr. stiele grade.

*G. aparine* L. Klebkraut. 6—10. Fr. hatig, borstig. Gemein.

*G. uliginosum* L. 6—9. Fr. körnig rauh, aber zahl. In den Torfjümpfen bei Lu. die verbreitetste Art.

*B.* Trugbolben endständig, rispig ob. quirlig, Stg. ohne Stacheln.

1. St. 3nervig, zu 4.

*G. boreale* L. 7,8. Stg. steif aufrecht, St. ohne Stachelspitze. Waldblößen zw. Falkenberg u. Alt-Sorgefeld Schw. \*F. Drehna, Weinberg!

*G. rotundifolium* L. 7,8. Stg. schlaff, St. kurz stachelspitzig. Rochauer Heide, vor dem neuen Forsthaufe unter Eichen M.

2. St. 1nervig zu 6—12.

a. *G. verum* L. 6—10. St. bottergelb. Trockne O. gemein.

b. St. weiß ob. gelblich weiß.

\* Stg. deutlich 4kantig.

*G. mollugo* L. 5—8. St. verkehrt eig. lanzettlich, Pfl. bis über 1 m hoch. Gemein. Auch in der var. *ochroleucum* Wolf (mit hellgelben St.) die von Anderen als Bastard *G. verum* × *mollugo* angesehen wird, um Lu. häufig.

*G. silvestre* Poll. 5—8. St. lineal-lanzettlich, Pfl. bis 30 cm hoch. \*F. Drehna, Rasenplätze im Park, eingeschleppt A. Auerbalz Rbh.

\*\* Stg. stielrund, 4riefig.

*G. silvaticum* L. 6,7. Rochauer Heide!

52. Fam. Valerianaceae D.C.

**Valeriana** L. Baldrian.

*V. officinalis* L. 7—9. St. zwittrig, auf allen Pfl. gleich groß, alle St. 5—10paarig gestielt. Lu. Wiesen u. Gebüsche der Torfmoore im Od. \*Bornsd. an den Teichen A.

*V. dioeca* L. 4—6. St. vielstgig, auf den männlichen Pfl. größer als auf den weibl. Wurzeln ungeteilt. Früchte O. häufig, z. B. südl. v. Lu.

**Valerianella Tourn.**

1. *Rh.* kaum deutlich, schief abgestutzt, der hintere Zahn größer.  
*V. dentata* Poll. 4,5. *Rh.* 3zählig, *Fr.* hinten flach. Zerstreut  
 d. d. G. z. B. Fels bei Gossmar!
- V. auricula* D.C. 7,8. *Rh.* 5zählig, *Fr.* hinten mit einer  
 Furche. Möchte wohl i. G. zu finden sein.
2. *Rh.* kaum unbedeutlich, kurz, mit 1 ob. 3 Zähnen.  
*V. olitoria* Poll. 3—5. Kapuzchen. *Rh.* kaum 3zählig, *Fr.*  
 rundlich eifg. Auf bebaute Boden häufig, der erste  
 grüne Salat des Jahres.
- V. carinata* Loisl. 4,5. *Rh.* kaum schwach 1zählig, *Fr.* läng-  
 lich. Am Weinberg bei Bornsd. Rbh.

## 53. Fam. Dipsaceae D.C.

- Dipsacus silvester** Mill. Karde. 7—9. Begründer bei  
 \*Cahnsd. u. Frankend. A. Auch am Frankendorfer  
 Moor!
- Knautia arvensis** Coulter. 7—10. Weg- u. Uferländer,  
 gemein.
- Succisa praemorsa** Asch. (*S. pratensis* Mch.) Ab-  
 biß. 8—9. Triften u. Waldränder nicht selten, z. B. viel  
 bei Langengrassau.
- Scabiosa columbaria** L. 6—10. Stg. kah!, Bl. rötlich-lila.  
 F. Drehna, Weinberg A.
- S. suaveolens* Desfort. 7,8. Stg. fein beha., Bl. blau. Trockne  
 Hügel u. Kiefernwälder bei Alt-Sorgefeld; Waltersd. in  
 den Kalkgruben westl. vom Bahndamm sehr viel; \*Gehren  
 Abhänge des Königsberges! Vor W. Drehna Tsch.

## 54. Fam. Compositae Adans.

- Eupatorium cannabinum** L. 7—9. Königundenkraut. 7—9.  
 Feuchte Gebüsche, Gräben bei Görld. Beesdau; Paserin;  
 Uckro!
- Tussilago farfara** L. 3—5. Huflattich. D. d. G. nicht  
 selten: Lu. an den Thongraben; Wittmannsd. bei den  
 Ziegeleien; Cahnsd.; Fresd. am Graben nach Cahnsd.  
 Frankendf.!
- Petasites officinalis** Mch. 3,4. Lu. am Müllerbad, ein-  
 zeln; angepflanzt u. üppig wuchernd Cahnsd. im Park!
- †**Stenactis annua** Nees. (Nordamerika). 7,8. Lu. Kirchhof  
 der Calauer Vorst. Schw. Wittmannsd. bei Winzerlings  
 Ziegelei!

**Erigeron acer** L. Berufstrauch. 6—8. Äste 1—3köpfig, Köpfe mittelgroß. Verstreut d. d. G. Lu. an den Chausseen nach Uckro, Langengrassau u. Wittmannsd. an den Wegen der Torfmoore! F. Drehna, Weinberg A.

var. *droebachiensis* O. F. Müll. Rochauer Heide an der Chaussee nach Hohenbucko bis jenseits der Pechhütte M.

†**E. canadensis** L. (Nordamerika). 7, 8. Äste mit zahlreichen, sehr kleinen Köpfchen. Auf dürrer Boden lästiges Unkraut. z. B. bei Langengrassau.

**Bellis perennis** L. Gänseblümchen, Maßlieb. 1—12. Gemein.

**Solidago virga aurea** L. Goldrute. 7, 8. Trockne Wälder u. Hügel: Rochauer u. Langengrassauer Heide! F. Drehna, Weinberg A.

**Inula** L. Mant.

1. †**J. helenium** L. 7, 8. Innere Hüllb. an der Spitze breiter, spatelf. Gebaut u. verw. Gossmar u. Beesdau Schw.

2. Innere Hüllb. am Ende zugespitzt.

**J. salicina** L. 7—10. Fr. B. u. Hüllb. fehl. \*Lu. Vorder- u. Hinterbusch unweit des Fressdorfer Borchelt; Frankendorfer Moor!

**J. britannica** L. 7, 8. Fr. turzha. B. unterseits langha. wollig. D. d. G. häufig. Bei Lu. sehr viel in den Torfmooren! N. St. Lu. Cahnsdorf; ferner Weg nach \*Cahnsd. Fresd. beim Borchelt A.

**Pulicaria Gaert.** Flohstrauch.

**P. prostrata** Asch. 7, 8. Strahlbl. kaum länger als die Scheibenbl. In Gräben u. in allen Dorfstraßen, besonders an feuchten Stellen: Bei \*Pickel A. \*Wüstermark M. \*Bornsd. Tsch. \*Cahnsd. A. Giessmannsd.; Pelkwitz; Paserin; Langengrassau; Fresd. Görlsd.!

**P. dysenterica** Gaertn. 7, 8. Strahlbl. 2—3mal so lang als die Scheibenbl. Langengrassau, Weg vor dem weßt. Ausgang des Dorfes, viel!

**Xanthium strumarium** L. 7—10. \*Cahnsd. A.

†**Rudbeckia laciniata** L. (Nordamerika). 8—10. Verw. Lu. Bäckedamm zw. Röllmersd. u. Giekmannsd. Tsch. u. am Schützenhause Schw. Bei Klein-Mehssow!

†**Helianthus annuus** L. Sonnenblume. (Amerika). 7—10. Gebaut u. einzeln auf Feldern verw.

**Bidens Tourn.** Zweizahn, Wasserdoß.

**B. tripartita** L. 7—9. Köpfe aufrecht, strahllos, B. steilig od. fiederfaltig. Sumpfige O. gemein.

*B. cernuus* L. 7—9. Kpf. nickend mit ob. ohne Strahl. B. ungeteilt. W. v. var. *radiatus* D.C. (Mit Strahl.) In den Torfsümpfen südl. v. Lu. nicht selten.

† *Galinsogea parviflora* Cav. (Amerika). 7.8. Im Lu. überall lästiges Unkraut. N. St. \*Promenade A.

### **Filago Tourn.** Filzfrant.

1. *F. germanica* L. 7—9. Hüllb. mit glänzender fast stehender Spitze. Wohl im G. zu finden.

2. Hüllb. stumpf, bei der Fr. reife sternfg. ausgebreitet.

*F. arvensis* L. 7—9. Stg. rispig mit einfachen Ästen u. ährlg angeordneten Köpfen. Auf Aedern nicht selten.

*F. minima* Fr. 7—9. Stg. mit gabligen Ästen, Köpfe gabel- u. endständig. Auf Aedern gemein, namentlich nördl. u. westl. von Lu.

### **Gnaphalium Tourn.** Ruhrkraut.

1. *G. dioecum* L. Katzenpfötchen. 5,6. Pfl. zweihäufig, Ft. der männl. meist weiß, die der weibl. rosa. D. d. G. häufig. N. St. Lu. Tristen hinter den Schanzen u. Thongruben.

2. Die äußeren St. weiblich, die inneren Zwitterst.

a. *G. luteo-album* L. 7—9. Hüllb. strohgelt. Lu. Aeder hinter der Schanze! \*Bornsd. an den Teichen A. Bei Langengrassau sehr zahlreich!

b. Hüllb. braun ob. bräunlich.

*G. uliginosum* L. 7—9. Köpfchen in beblätterten. Anhängeln. Häufig an feuchten O. z. B. Zaakow; Zöllmersd. Langengrassau!

*G. silvaticum* L. 7—10. Köpfchen eine beblätterte zusammengesetzte Aehre od. Traube bildend. Hochauer, Langengrassauer u. Kemliher Heide: zahlreich bei der Betschütte; Chausseegräben vor Zöllmersd!

***Helichrysum arenarium* D.C.** Immortelle. 7—10. Wegränder u. sandige Tristen, häufig. N. St. süd-westl. von Wierigsd.

### **Arthemisia L.** Beifuß.

1. Fr. boden kahl.

a. B. am Grunde des St. Stiel mit Döhrchen.

*A. campestris* L. 8—9. Köpfchen kahl, rundlich. Begränder, gemein.

*A. vulgaris* L. 7—10. Köpfchen flügl. länglich eifg. W. v.

b. † *A. abrotanum* L. Eberraute. (Südeuropa). 8,9. B. ohne Döhrchen. Cahnsd. Schulgarten, verw. Schw.

2. † *A. absinthium* L. Wermut. (Süddeutschland). 7—9.

Dorfftraßen verm. Uckro; \*Paserin viel; Cahnstdf.  
F. Drehna A.

### **Achillea** L. Schafgarbe.

A. ptarmica L. 7—9. B. ungeteilt. D. d. G. häufig,  
besonders viel in den Torfmooren südl. von Lu!  
\*Bornsdorfer Leiche A.

A. millefolium L. 6—9. B. doppelt fiederteilig. Gemein.

### **Anthemis** L. Hundsfamilie.

A. cotula L. 7—9. B. ziemlich zahl, Spreub. chen lineal-borstlich,  
nur an der Spitze des Kelchsg. Fruchtbodens. Cahnstdf. Bees-  
dau A. Pelkowitz!

A. arvensis L. 8,9. B. weichha. Spreub. chen lanzettlich, starr.  
Gemein.

### **Chrysanthemum** L.

1. Fr. boden halbkuglig, nicht Kelchsg.

a. C. leucanthemum L. 5—8. Fr. der Scheibenbt. ohne Achsaum,  
B. einfach, grob gezähnt ob. gekerbt. D. d. G. nicht selten.  
N. St. Lu. Grüner Weg!

b. Fr. mit kronensg. Saum, B. fiederteilig.

C. tanacetum Karsch. Rainfarn. 7—10. Randbt. nicht  
strahlend. Weg- u. Aderränder vor u. bei Cahnstdf. viel!

+ C. parthenium Pers. 6—10. Randbt. strahlend. Dorffstra-  
ßen; z. B. \*Beesdau!

2. Fr. boden Kelchsg., B. doppelt fiederteilig.

C. chamomilla P.M.E. Achte Kamille. 5—7. Fr. boden  
höhl. Acker, Begründer, z. B. Lu. nach Wittmannsd.  
zu; Pelkowitz etc.

C. inodorum L. 6—10. Fr. boden nicht höhl. An der Sä-  
gemühle südl. von Trebbinchen Rbh.

**Arnica** montana L. Wohlverlei. 6. Wanninchen, Wiese  
an der Mühle Schw. Bornsd.!

### **Senecio** L. Kreuzkraut.

1. S. paluster D.C. (Cineraria p. L.). 5—7. Rein Aus-  
sicht. Torfsümpfe, verbreitet: Lu. Wittmannsd.  
Gossmar; Uckro; Paserin!

2. Süßlich noch von kleinen B. chen. (Aussicht.) umgeben.

a. S. vulgaris L. 1—12. Strahl fühlend. Gemein.

b. Strahl kurz, schmal, zurückgerollt.

S. viscosus L. 6—10. B. drüsig zottig. Langengrassau!  
An der Chaussee vor Wüstermarke Schw.

S. silvaticus L. 6—8. B. ohne Drüsen, wollig. \*Wesfl. von  
Langengrassau; \*Babben A. Gr.-Mehsow Schw.

c. Randbt. strahlend abstehend.



- \* *S. vernalis* W. K. 5,6. Außentf. 6—12blättrig, fast bis zur Mitte schwarz. \*Uckro! \*Wierigsdf. Tsch. Zaakow! Lu. am Wege nach Frankendf. Schw. Aber auch an diesen O. einzeln u. unbeständig!
- \*\* Außentf. 1—2blättrig.
- S. aquaticus* Huds. 6—8. B. abschnitte nach vorwärts gerichtet, Jr. der Scheibenbt. kurzha. Grenzgraben zw. Wierigsdf. u. Karche einzeln! (zu bestätigen).
- S. jacobaea* L. 7—10. B. abschnitte rechtwinklig abstehend, Jr. undeutlich flaumig ob. kahl. Trockne O. d. d. G. nicht selten.
- Carlina vulgaris** L. Eberwurz. 7—9. D. d. G. nicht selten: \*Uckro, Stelle der alten Ziegelei A. Langengrassau! \*Waltersdf. Strubeberg; Gehren u. f. f. auf dem Höhenzuge bis \*Weissagk u. \*F. Drehna A. Aber auch zw. Lu. u. Wittmannsd. sowie auf Cahnisdorfer Flur nicht selten!
- Centaurea** L. Stoddenblume.
1. *C. jacea* L. 6—10. Hüllb. an der Spitze mit trockenhäutigem Anhängsel. Gemein.
  2. Hüllb. krautig mit trockenhäutigem (gefranzten) Saum.
    - a. *C. cyanus* L. Kornblume. 6—8. St. blau (selten rosa ob. weiß), obere B. einfach lineal. Gemein.
    - b. St. rot, obere B. fiederteilig.
  - C. scabiosa* L. 7,8. Köpfe groß (3—4 cm.), Nester einköpfig. Zerstreut d. d. G. N. St. Lu. u. Zöllmersdf. an der Chaussee nach Uckro!
  - C. paniculata* Jacq. 7—10. Köpfe klein (1—2 cm), Stg. rispig ästig. Häufiger als vor: Lu. Zöllmersdf. Cahnisd. Wanninchen viel! \*F. Drehna! Hier z. B. auf dem Weinberg A.
- Serratula tinctoria** L. Scharte. 7—9. Nicht selten: Bälwiesen zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf! Cahnisd. auf u. an der Calauer Chaussee Schw. Zw. Lu. n. Fresdf. auf Grasplätzen u. an Gebüschen! F. Drehna, Weinberg A. Nördl. von letzterem St. O. auch mit lauter gesiederten B. 1881!
- Lappa Tourn.** Klette.
1. *L. officinalis* All. 7,8. Alle Hüllb. kahl, grün, länger als die zt. \*Bornsd. bei der Ziegelscheune! \*Cahnisd. A.
  2. Hüllb. spinwebig wollig, innere a. d. Spitze rötlich, kürzer als die St.
    - L. glabra* Lmk. 7—9. Alle Hüllb. hatig. Nicht selten, z. B. Giessmannsd!
    - L. tomentosa* Lmk. 7—9. Innere Hüllb. stumpf mit kurzer Stachelspitze. Sicher noch zu finden.

**Onopordon acanthium** L. 7—9. Nicht selten: Uckro, am Bahnübergang; Paserin; Görtsdf. Wanninchen!

**Carduus Tourn.** Distel.

1. *C. nutans* L. 7, 8. Hüßb. über dem eig. Gr. zusammengeknürrt u. zurückgebogen. Zerstreut d. d. G. R. Et. Lu. Abhänge der Chauffeegräben zw. den Schanzen!
2. Hüßb. angebrüht od. bogenfg. absteig. d.  
*C. acanthoides* L. 6—9. Köpfe einzeln, B. unterseits kurzha. Rbh.  
*C. crispus* L. 7—10. Körfe meist gehäuft, B. unterf. spinne webig = filzig. Im Lu. häufig als Unkraut in Gärten z. B. an der Promenade! \*Cahnsdf. Wall Dumas.

**Cirsium Tourn.** Kratzdistel.

1. *C. lanceolatum* Scop. 6—9. B. oberseits bornig kurzha. Gemein.
2. B. oberseits nicht bornig.  
a. *C. acaule* All. 7—9. Stg. fehlend od. sehr kurz. Fast überall auf Tristen u. an Waldrändern, z. B. \*Uckro; \*Cahnsdf. \*Pademagk; \*F. Drehna A. Gehren! var. *dubium* Willd. Langengrassau, bei der Ziegelei!  
b. Stg. hoch (über 50 cm).  
\* *C. oleraceum* Scop. 7—9. St. gelblich weiß. Waltersdf. Schw. Lu. an der Bäte links von der Golsener Chauffee!  
\*\* St. purpurn.  
*C. arvense* Scop. 7—9. St. zweihäufig, B. meist kraus, nicht od. wenig herablaufend, Köpfchen in rispigen Dolbentrauben. Gemein.  
*C. palustre* Scop. 6—9. St. zwitt. ig, B. vollkommen herablaufend, Köpfchen traubig geknüllt. Gemein.

† **Silybum marianum** Gaertn. (Südeuropa). 7, 8. Als Blattpfl. gezogen u. verw. z. B. Lu. am Gohmarischen Fließ Schw.

**Lampsana communis** L. 6—8. Häufig an Gebüsch u. Hecken!

**Arnoseris minima** Lk. 6—9. Nicht selten: Sehr zahlreich bei Pelkwitz u. um Gossmar!

**Cichorium intubus** L. Cichorie. 7—8. Weg- u. Aderränder gemein.

**Thrinia hirta** Rth. 7—11. Lu. Zaakow! \*Cahnsdf. \*Fresdf. Borchelstwiefen; \*Bornsd. Großer Teich A.

**Leontodon auctumnalis** L. 7—10. Stg. ästig, mehrköpfig. St. Hl. unter den Köpfen verblüht. Nicht selten, z. B. bei Riedebeck; Lu. an der Calauer Chauffee!

**Leontodon hispidus** L. 6—10. Stg. ungeteilt, eßsig, in St. fl. wenig verblüht. D. d. G. ziemlich häufig.

**Picris hieracioides** L. Bitterkraut. 7—9. \*Cahnsdf. Wall A. Bäfedamm zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf; Lu. an der Berste; Fresdf. am Fließwege nach Ludau!

**Tragopogon pratensis** L. Bodsbart. 5—7. Lu. an der Berste Schw. Cahnsdf. Wall; Fresdf. Borcheltwiesen!

**Hypochoeris** L. Ferkelkraut.

**H. glabra** L. 6—9. Jüngere Hüllb. so lang als die Randbl. Auf Aedern nicht selten, so bei Pelkwiiz, Paserin u. Uckro!

**H. radicata** L. 7,8. Jüngere Hüllb. kürzer als die Randbl. Häufig.

**Achyrophorus maculatus** Scop. 6,7. Im Auerbalz bei Langengrassau Rbh.

**Taraxacum vulgare** Schrk. Ruchblume. 4—10. Gemein. var. *paludosum* Schl. Cahnsdf. \*Fresdf. Borcheltwiesen; Lu. Vorder- u. Hinterbusch! \*Beesdan, Sumpfwiese am Wege nach Gossmar A.

**Chondrilla juncea** L. Auorpelsalat. 7,8. Aderraine südöstl. von Lu. Bornsdf.!

**Prenanthes purpurea** L. Hasenlattich. 7,8. Rochauer Heide Rbh.

**Lactuca** L. Lattich.

1. **L. muralis** Less. 6—8. B. gestielt. Görlsdf. Busch; Waltersdf. an den Quellen.

2. B. sitzend, Stengelumsfassend.

a. **L. sativa** L. Salat. 7,8. B. grund herzf. Gebaut.

b. B. grund Pfeilf.

**L. scariola** L. 7—10. Fr. etwa so lang als ihr Schnabel. Im Lu. Rbh.

**L. saligna** L. 7,8. Fr. halb so l. als ihr Schn. Cahnsdf. Biehweide Rbh.

**Sonchus** L. Gaudistel.

1. **S. arvensis** L. 7—10. Hüllb. u. oberer Teil des Stg. dicht drüsig beha. Stg. unten einfach, W. stock kriechend. Im Lu. häufig.

2. Hüllb. u. Stg. kahl, Stg. ästig, Pfl. einjährig, Fr. 3rippig.

**S. oleraceus** L. 6—10. Fr. fein querrunlig, Dehrchen der B. zugespitzt. Häufig.

**S. asper** Vill. 6—10. Fr. nicht querrunlig, Dehrchen herzf. abgerundet. Nicht häufig: F. Drehna Graben am Ritzelteich!

**Crepis L. Pippau.**

1. *C. paludosa* Munch. 5,6. Pappus schmutzig weiß, zerbrechlich. Lu. am Goßmarschen Fließ; Sumpfwiesen östl. Polkwitz viel!
2. Pappus schneeweiß, biegsam.
  - a. Äußere Hüllb. abstehend.
    - C. tectorum* L. 5—10. Obere Stg.b. am Rande umgerollt mit pfeilfg. Grunde. Acker u. Begränder, gemein.
    - C. biennis* L. 6—8. Obere Stg.b. flach, mit löcherförmig gezähneltem Gr. Bei Langengrassau; Zaakow; Pitschen u. a. D. um Lu. Rbh.
  - b. *C. virens* Vill. 6—10. Äußere Hüllb. angebrüdt. Wiesen, Gebüsch, Begränder bei Frankendf. Chaussee nach Wittmannsd. viel!

**Hieracium Tourn. Habichtskraut.**

- A. B. in grundständiger Rosette, Stg. nackt od. wenig beblättert.
  1. Bstod mit Ausläufern, Gr.b. ganzrandig, nebst dem Stg. borstig, Pappus gleichfg. einreihig.
    - a. *H. pilosella* L. 5,6. Stg. einköpfig. Trockne D. gemein.
    - b. Stg. bodentraubig, vielblütig.
      - \* B. blaugrün.
        - H. auricula* L. 5,6. B. kahl, nur um Grunde gewimpert. Um Lu. nicht selten, viel in den Torfmooren südl. der Stadt! Cahnstdf. an der Chaussee nach Lübben Schw. Vor Beesdau! \*F. Drehna, Part u. Wiesen A.
        - H. praealtum* Vill. 6,7. B. am Rande u. an den Rippen der Unterseite borstig. Fresdf. westl. vom Borchelt u. in Grassgärten!
      - \*\* B. grasgrün od. schwärzlich-grün.
        - H. echioides* Lumn. 7—9. Stg. mit 10—12 B. Hügel b. Weissagk u. Krinitz Rbh.
        - H. pratense* Tausch. 6. Stg. mit 1—3 B. Bei Lu. u. Cahnstdf. zerstreut! Poetensteig Schw.
  2. Bstod ohne Ausl., Rosettenb. gezähnt, Pap. ungleichfg. zweireihig.
    - H. murorum* L. 5—7. Ros.b. zahlreich, Stg.b. 1—2. Häufig z. B. westl. v. Langengrassau!
    - H. vulgatum* Fr. 6,7. Ros.b. wenig zahlreich, Stg.b. 2—6. Görlstdf. im Busch!
- B. Stg. der ganzen Länge nach beblättert, keine Rosette.
  1. *H. laevigatum* Willd. 7,8. Stg. entfernt beblättert, innere Rb.b. spitz. F. Drehna, in der Richtung auf Bademag!?
  2. Stg. dicht beblättert, (innere Rb.b. stumpf.)
    - H. umbellatum* L. 7—10. Äußere Hüllb. zurückgebogen. Lu.

auf dem Bafedamm! Am großen Graten b. Cahnsdf.  
viel; bei F. Drehna!

**Hieracium boreale** Fr. 7—10. Neugere Südb. nicht od. wenig  
abstehend. Lu. in den Torfmooren viel; Frankendf. \*Cahnsdf.  
Wall A.

## 55. Fam. Campanulaceae Juss.

**Jasione montana** L. 6—8. Trockne O. häufig. N. St. Schanze.

**Phyteuma spicatum** L. Teufelskralle. 5, 6. Südl. von  
Weissagk Schw. var. *nigrum* Döll. (St. dunkelblau). \*F.  
Drehna, Grasplätze im Park. einzeln!

**Campanula** L. Glockenblume.

1. St. gestielt, in Trauben od. Rispen.

a. Kapseln aufrecht.

\***C. persicifolia** L. 6, 7. Sch. zispel lanzettlich, Stg. armbütlig.  
Bei Weissagk Rbh.

\*\* Sch. zispel pfriemlich, St. rispig.

**C. patula** L. 5—7. Rispe ausgebreitet, B. flach. Häufig.

**C. rapunculus** L. 5—8. Rispe lang, fast traubig, B. am  
Rande wellig. Wüstermarke Grassmann.

b. Kapseln überhängend.

\* **C. rotundifolia** L. 6—10. Obere B. linealisch, Stg. rund.  
Überall auf Tristen u. in Wäldern gemein.

\*\* Obere B. breiter, Stg. kantig.

**C. rapunculoides** L. 6—8. B. kurzha. Traube einseitigwendig.  
In Gärten, aber vielleicht noch wild i. G. zu finden.

**C. trachelium** L. 7, 8. B. steifha. Stg. scharfkantig. Laubwälder  
u. Gebüsch: Lu. an der Bäfte, Cahnsdf. Gebüsch  
am Wall; Görldsf. Waltersdf. Gehren!

**C. latifolia** L. 6, 7. B. weichha. Stg. stumpfkantig. (Unter  
Gesträuch bei Giessmannsd. Rbh.

2. **C. glomerata** L. 7—10. St. sitzend, in End- u. Seitensköpfchen.  
Auf Lehm: Lu. Prinzessinnensteig; an der Bäfte zw.  
Zöllmersdf. u. Wierigsdf. \*Cahnsdf., Wall A.  
Graben von da nach der Calauer Chaussee!

† **Specularia speculum** D.C. f. Venuspiegel. 6—8. Berm.  
nördl. von Lu. zw. den Gärten.

## 56. Fam. Siphonandrae Klotzsch.

**Vaccinium myrtillus** L. Heidelbeere. 5. Beere schwarzblau.  
Wälder, häufig, j. B. \*Gahroer Buchheide; \*Drehnaer

Forst; \*Gr.-Mehssow A. Ebenso in den Waldungen des westl. Theiles d. G.!

*V. vitis idaea* L. Preiselbeere. 5,6. Beere rot, Stg. aufrecht. Wälder u. Waldblößen, häufig. Sehr viel zw. \*Gahro A. u. Krinitz!

*V. oxycoccos* L. Moosbeere. 5,6. Beere rötlich, Stg. fadenfg., triebend. Torfmoospolster bei \*Langengrassau, am Fuß der Hölleberge; \*Pademagk!

*Arctostaphylus uva ursi* Spr. 4,5. Trockne Wälder: Östl. von Alt-Sorgefeld Schw. \*Rochauer Seide M.

## 57. Fam. Ericaceae Klotzsch.

*Calluna vulgaris* Salisbury. Heidekraut. 8—10. Gemein.

*Erica tetralix* L. 7—10. Auf Moorboden im südl. Teile d. G. sehr verbreitet zw. F. Drehna einerseits u. den Dörfern \*Beesdau, \*Wanninchen A. Presenchen, Pademagk, Tugam \*(Sand-Teich A.) u. Gr.-Mehssow andererseits!

## 58. Fam. Rhodoraceae Klotzsch.

*Ledum palustre* L. Forst, Mottenkraut. 5—7. \*Zw. Beesdau u. Stiebsdf. vereinzelt; \*F. Drehna westl. u. südwestl. vom Sand-Teich viel A.

## 59. Hypopitaceae Klotzsch.

*Pirola Tourn.* Wintergrün.

1. St. in Trauben.

a. Kr. glödig, offen.

*P. rotundifolia* L. 6,7. Sch. zispel lanzettlich, B. kürzer als ihr St. In den Bergen bei Bornsd. Rbh.

*P. chlorantha* Sw. 6,7. Sch. zispel eiförmig, B. so lang als ihr St. \*Gahro, in den hohen Riefen der sogen. Buchheide!

b. *P. minor* L. 6,7. Kr. zuglig, den Griffel einschließend. In den Bergen bei Bornsd. Rbh.

2. *P. uniflora* L. 5,6. St. einzeln. \*Gahroer Seide!

*Chimophila umbellata* Nutt. 6—8. \*Rochauer Seide M.

*Ranunculus secunda* Gke. 6,7. \*Gahroer Seide A.

*Monotropa hypopitys* L. Fichtenspargel. 6—8. \*Rochauer Seide M. zw. Neu-Sorgefeld u. der Buchhütte; Gehren unweit des Fußsteigs nach W. Drehna; süd-östl. v. F. Drehna im Riefenwalde!

## 60. Fam. Oleaceae Lindl.

**Ligustrum vulgare** L. Liguster, Rainweide. 6,7. Zu Heften überall angepflanzt.

†**Syringa vulgaris** L. Flieder (spanischer). (Ungarn). 5,6. Cult.

**Fraxinus excelsior** L. Esche. 4,5. Angepflanzt, viel bei Lu.

## 61. Fam. Apocynaceae R.Br.

**Vinca minor** L. Immergrün. 4,5. Wild in der \*Gahroer Seide Rössler. Auf Friedhöfen u. in Gärten angepflanzt.

## 62. Fam. Gentianaceae Juss.

**Menyanthes trifoliata** L. Fieberflee. 5,6. Lu. u. Wittmannsd. in den Torfmooren! \*Paserin; F. Drehna, Waldwiesen A. Waltersd. Wierigsd.!

**Gentiana Tourn.** Enzian.

1. Schlund der Kr.röhre fehl.

**G. cruciata** L. 6—8. St. quirlig, 4spaltig. Bei Fresd. auf den Wiesen Rbh.

**G. pneumonanthe** L. 7—9. St. gegen- u. wechseltbg, 5spaltig. Wiesen \*zw. Riedebeck u. Beesdau A. Zw. F. Drehna, Pademagk u. Presenchen! \*Am Sand-Teich A.

2. **G. amarella** L. 9,10. Schlund bärtig. Wiesen bei Cahnsd. Beesdau u. Waltersd. Rbh.

**Erythraea centaurium** Pers. Tausendgüldenfraut. 7—9.

Stg. einfach, St. gleich hoch in Ebensträusen. Wiesen u. Gebüsche d. d. G. nicht selten: Lu. Bäfewiesen; Cahnsd. an der Chaussee nach Lübben; Fresd. Borcheltwiesen; östl. von Wanninchen; Langengrassau, Gutungen bei der Ziegelei; Gehren, unweit des Teufelssteines!

**E. pulchella** Fr. 7—9. Stg. sehr ästig, St. blattwinkeltbg. \*Östl. von Lu.! \*Cahnsd. viel; \*Uckro; \*Bornsd. bei der Ziegelscheune A.

## 63. Fam. Convolvulaceae Vent.

**Convolvulus** L. Winde.

**C. sepium** L. 7—10. Dedb. groß, den Rk. umgebend. Gebüsche, häufig.

**C. arvensis** L. 6—10. Dedb. kl. vom Rk. entfernt. Gemein.

**Cuscuta Tourn.** Seide.

1. Stg. ästig, Kr.röhre zur St.zeit walzig.

- C. *europaea* L. 6—8. Schuppen der Kr.röhre angebrüht. Lu. Hede in der grünen Gasse auf Crataegus; auf urtica d. in Giessmannsd. am östl. Ausgang; Gehren am südl. Ausgang des Dorfes 1881!
- C. *epithymum* Murr. Kleejeide. 7—9. Schuppen i. d. Kr.=röhre zusammengeneigt, den Schlund schließend. Nicht selten: Nördl. von Lu. auf Luzerne; Cahnsd. auf Klee u. Luzerne; Frankendf.; Görlsd. häufig; F. Drehna, Felder nach Presenchen zu; Wüstermarke auf Sarrothamnus n.!
- C. *epilinum* Weihe. Flachseide. 6—8. Bei Zaakow u. Lu. Feld an der Berfte nördl. der Stadt 1881!

## 64. Borraginaceae Juss.

- Asperugo** procumbens L. 5,6. Begränder nicht häufig: Lu. unweit des Hainweges! Frankendf. am Kirchhof Schw.
- Lappula** myosotis Mch. Zgelsame. 6,7. Lu. auf der Stadtmauer viel! \*Fresdf. Borchelt A. \*Bornsdf. östl. Seite des Herrenhofes!
- Cynoglossum** officinale L. Hundszunge. 5—7. Lu. auf der Stadtmauer; Fresdf. Borchelt! \*Bornsdf. bei der Ziegelscheune; \*F. Drehna, bei d. meisten Kirche A.
- Anchusa** officinalis L. Ochsenzunge. 5—10. Kr.röhre grabe. J. G. fast fehlend: Giessmannsd. in der Dorfstraße!
- A. arvensis** M. B. Krummhals. 6—10. Kr.röhre gekniet. Häufig.
- Symphytum** officinale L. Schwarzwurz. 5,6. Gräben u. feuchte Wiesen, häufig, namentl. um Lu.
- Echium** vulgare L. Ratterzunge. 5—9. Sandige D. Gem.
- Pulmonaria** officinalis L. Lungenkraut. 4,5. Stg.b. eifg. \*Waltersdf. im S. des Dorfes!
- P. angustifolia** L. 4,5. Stg.b. schmal, lanzettlich. \*Nordabhang des Weinberges bei F. Drehna!
- Lithospermum** arvense L. Bauernschminke. 4—6. Nieder- u. Begränder gemein. Blau blühend Lu. auf einem Felde an der Bäfte unweit der Chaussee nach Wierigsd. 1875!
- Myosotis** Dillen. Bergißmeinnicht, Mäuseohr.
1. St. mit angebrühten Sa.
- M. palustris** With. 5—8. Stg. unten kantig. Sumpfige D. gemein.
- M. caespitosa** Schultz. 5—9. Stg. stielrund. Uckro, Gebüsch auf der Westseite des Bahndammes; F. Drehna, im Laubwalde hinter der Ziegelei! var *laxa* Asch.



(Etg. schaff, Wid. In sehr loder.) Wiesen zw. Bornsd. u. Weissagk!

2. Aq. mit absteigenden häufig gekrümmten Ha.

a. Fr. sch. geschlossen.

*M. intermedia* Lk. 5—10. Fr. schl. wenigstens doppelt so lang als d. Aq. Meier u. Gärten um Lu. häufig; F. Drehna!

*M. arenaria* Schrad. 4—6. Fr. schl. kürzer als d. Aq. Gemein.

*M. versicolor* Sm. 5,6. Fr. schl. wenig länger als d. Aq., Kr. doppelt so lang als d. Aq. Grasplätze nord-östl. v. Wittmannsd. Gehren, bei der Schiele-Mühle viel!

b. Fr. sch. offen.

*M. hispida* Schlecht. 5,6. Fr. schl. wagrecht absteigend. Trockne Grasplätze: Lu. an den Mühlen u. den Chausseerändern nach Langengrassau zu; Cahnsd. an der Calauer Chaussee; Beesdau!

*M. sparsiflora* Mikan 5,6. untere Fr. schl. gekrümmt, die fl. St. entfernt zw. d. B. des weitschweifig ästigen Etg. Uckro Rbh.

## 65. Fam. Solanaceae Juss.

†*Lycium barbarum* L. Teufelszwirn. (Südeuropa). 6—10. In Feden angepflanzt u. vielfach verw.

†*Solanum tuberosum* L. Kartoffel. (Südamerika). 6—8.

B. unpaarig gefiedert. Gebaut.

*S. nigrum* L. Nachtschatten. 6—10. B. ungeteilt, Etg. trautig,

Fr. tuglig, schwarz. Schutt, Begränder, Meier, gemein.

*S. dulcamara* L. Bittersüß 6—8. B. ungeteilt, Etg. strauchig, Fr. eifg., rot. In Gebüsch d. d. G. häufig.

*Atropa belladonna* L. Tollkirsche. 6—8. \*Lu. an der Stadtmauer im S. seit 12 Jahren u. auch 1881 noch gefunden! (Wahrscheinlich im Sommer d. J. ausgerottet).

*Hyoscyamus niger* L. Busenfraut. 6—10. B. d. G. in allen Dorfstraßen häufig; massenhaft in Langengrassau! \*Riedebeck; \*Cahnsd. A.

†*Datura stramonium* L. Stechapfel. (Süd-Rußland). 7—9. Zahlreich in vielen Dörfern d. G. namentlich nördl. von Lu. z. B. Giessmannsd. Karche etc. aber auch in Zöllmersd. Fresd. u. a. D.

†*Nicotiana tabacum* L. Tabak. (Südamerika). 7—10. St. hellrot, Fr. langröhrig. Gebaut.

†*N. rustica* L. Bauerntabak. (Mexiko). 7—9. St. grünlich gelb, Fr. kurzröhrig. Auf Feldern nord-östl. von Lu. einzeln verw.!

## 66. Fam. Scrophulariaceae R.Br.

**Verbascum** L. Wollkraut, Königsfleece.

1. St. kurzgestielt in Büscheln ob. Trugbolben.

a. Alle 5 Stbfb. wollig.

V. nigrum L. 6—9. Wollf. des Stbfb. violett. Zerstreut d. d. G. Görlsd. Wannichen; Zöllmersd.!

V. lychnitis L. 6—9. Wollf. der Stbfb. weiß. D. d. G. nicht selten, sehr zahlreich bei Zöllmersd.! \*Jw. Riedebeck u. Bornsd. A.

b. Die 3 oberen Stbfb. kürzer, weißwollig, die 2 unteren länger, kahl.

V. thapsus L. 7—10. St. kurz trichterig, die 2 längeren Stbfb. 4mal so lang als ihre Antheren. \*Cahnsd. ehemal. Bichweide Dumas.

V. thapsiforme Schrad. 7—10. St. radfg. die 2 l. Stbfb. 2mal s. l. als ihre Anth. Paserin!

2. St. lang gestielt, einzeln in d. Achseln schmaler Tragb.

V. blattaria L. 6—8. St. gelb (selten weiß). Um Lu. Riedebeck; Schlabendf. Rbh.

V. phoeniceum L. 5—7. St. violett, am Gr. gelblich. Bei Lu. Rbh.

**Scrophularia** nodosa L. 6—9. Stg. 4kantig, nebst d. Bl. ungestübelt. In feuchten Gebüschen häufig.

S. alata Gil. 7—9. Stg. 4kantig, nebst d. Bl. gestübelt. Wohl noch i. G. zu finden.

**Antirrhinum** orontium L. Löwenmaul. 6—10. Häufig bei \*Paserin R. u. Cahnsd.! Sonst zerstreut d. d. G. Um Karche; Gehren; Frankendf. etc.! \*Uckro L. \*Bornsd. M. \*F. Drehna, Weinbg. R.

**Linaria** Tourn. Frauenfleece.

1. Stg. niederliegend mit rankenartigen Aesten.

†L. cymbalaria Mill. 5—10. Stg. kahl, Bl. klappig. Vereinzelt auf der Luckauer Stadtmauer Schw.

L. elatine Mill. 7—10. Stg. zottig, Bl. spießfg. Deftlich von Lu. \*Cahnsd. bis zur Grenze nach Altenow hin, Fresd. Frankendf.! \*F. Drehna, Weinbg. R.

2. Stg. aufrecht.

a. L. minor Desf. 6—10. St. einzeln in den Bl. winkeln. Östl. u. süd-östl. von Lu. Bei Karche; \*Cahnsd. (sehr viel) u. von da über Frankendf. Fresd. u. \*Görlsd. bis Beesdau!

b. St. traubig ob. ährig angeordnet.

L. arvensis Desf. 6—10. St. hellblau, klein. \*Lu. Nieder nördl. u. westl. der Schanze!

*Linaria vulgaris* Mill. 6—10. St. gelb, groß. Trodne D. gemein. Bestl. von Wierigsdf. u. bei Fresdf. westl. vom Borchelt mit Belorienbildung 1881!

*Gratiola officinalis* L. Gnadentraut 6—8. Auf den Borcheltwiesen dicht bei Fresdf. Rbh.

*Limosella aquatica* L. 6—10. \*Bornsdf. Gr.-Teich A.

*Veronica Tourn.* Ehrenpreis.

A. St. gestielt, einzeln in den B.-achseln.

1. Alle B. abwechselnd.

V. *hederifolia* L. 3—5. B. herzförmig, rundlich, 3—5lappig. Ueberall gemein.

V. *persica* Poir. 4,5. u. 7—10. B. rundlich eiförmig, tief herbigesägt. \*Nördl. von Lu. auf Acker u. Gartenland!

2. Untere B. gegenständig, die übrigen abw. alle deutlich gestielt.

a. V. *agrestis* L. 4,5 u. 7—10. St. bläulich weiß, unterster Zipfel meist kleiner, weiß. Um Lu. gemein auf bebautem Boden.

b. St. dunkelblau.

V. *opaca* Fr. 4,5. u. 7—10. Achselpf. stumpf, Kapsel gestielt. Auf lehmigen Aedern nördl. von Lu. u. bei Fresdf.!

V. *polita* Fr. 4,5. u. 7—10. Achselpf. spitzlich, Kaps. ungestielt. \*Lu. Aeder an der Promenade A.

B. St. gestielt in endständ. lockerer Traube, deren Dedb. von den Stg.b. wenig verschieden sind, aber kleiner.

1. B. ganz, ganzrandig ob. gekerbt.

a. Einjährige Pfl. mit dünnen spinselförm. Brztl.

V. *praecox* All. 4—6. Pfl. brüßig beha. Kaps. gebunsen, länger als br. Bei Fresdf. Rbh.

V. *arvensis* L. 4—10. Pfl. absteigend beha. Kaps. etwa so l. als br. tief spitzwinklig ausgerandet. In unmittelbarer Nähe von Lu. sehr vereinzelt, sonst häufiger, z. B. Uckro; Langengrassau; Beesdau!

b. V. *serpyllifolia* L. 4—10. Pfl. ausdauernd, mit kriechendem Wurzelstock, St. bläulich ob. weiß. D. d. G. nicht selten: N. St. Lu. Grasplätze u. Begränder nördl. der Stadt u. am Wege nach Cahnndf.!

2. V. *triphylla* L. 3—6. B. handtellig. Aeder, häufig.

3. V. *verna* L. 4—6. B. fiederförmig. Scheint um Lu. zu fehlen, sonst nicht selten: \*Uckro; \*F. Drehna bei der wüsten Kirche A.

C. St. kurz gestielt ob. sitzend in endständiger Aehre. Dedb. klein von den Stengelb. sehr verschieden.

V. *longifolia* L. 7,8. B. bis zur Spitze scharf gesägt. Wild im G. noch nicht gefunden, aber in Gärten cultiviert z. B. Lu.

*Veronica spicata* L. 6—10. B. an der Spitze ganzrandig. Auf dem Höhenzuge von \*Uckro A. bis Gehren nicht selten; zahlreich auf dem Aussichtspunkt des Königsberges! In den Wäldern zw. Langengrassau u. Alt-Sorgefeld häufig! \*F. Drehna, Weinbg. A.

D. St. in gestielten achselstg. Trauben od. Ähren.

1. Rch. 5teilig.

*V. latifolia* L. 6, 7. Alle Stg. aufrecht. Görlsdf. Bornsdf. an der wüsten Kirche Grassmann.

*V. prostrata* L. 4, 5. Unfruchtbare Stg. niederliegend. Bei Zöllmersdf. Giessmannsdf. u. F. Drehna Rbh.

2. Rch. 4teilig.

a. Stg. rundum beha.

*V. officinalis* L. 6—8. B. kurz gestielt. Um Lu. sehr einzeln z. B. Prinzeßinnensteig; aber häufig bei Uckro; Langengrassau; Gehren; Wanninchen; F. Drehna; Bornsdf.!

*V. montana* L. 5, 6. B. langgestielt. Rochauer Heide Rbh.

b. *V. chamaedrys* L. 4—6. Stg. einreihig beha. Gemein.

c. Stg. kahl.

*V. anagallis aquatica* L. 5—9. B. lanzettlich, spitz, Trauben gegenstg. Um Lu. nicht selten: Gräben westl. v. d. Bäfte, Gossmarsches Fließ!

*V. beccabunga* L. 5—8. B. rundlich stumpf, Trbn gegenstg. In u. an Gräben nicht selten: Am Gossmarschen Fließ von Lu. an über Gossmar hinaus bis zur Schiele-mühle bei Gehren; Gräben westl. v. d. Bäfte; Pelkowitz; Paserin; Langengrassau; Wüstermarke, Eingang d. Schlucht; Waltersdf.!

*V. scutellata* L. 5—7. B. lineal bis lanzettlich, Trbn abwechselnd. An sumpfigen O. nicht selten: Torfmoore bei L. Wittmannsdf. Fresdf. Görlsdf. Zöllmersdf. westl. von der Bäfte; zw. Pademagk u. Wanninchen am Gr.-Teich!

**Melampyrum Tourn.** Ruh- od. Nachtelweizen.

1. *M. arvense* L. 6—9. Ähren allseitswendig. Dedb. purpurn. \*Zw. Gossmar u. Fresdf. A. Bei \*Frankendf. u. \*Görlsdf. viel; \*Langengrassau!

2. Ähren einseitswendig.

*M. nemorosum* L. 6—9. Dedb. am Gr. herzf. meist blauviolett. \*Cahnsdf. am Wall viel A. Ebenso Zöllmersdf. unweit der Chaussee u. westl. von Paserin!

*M. pratense* L. 6—8. Dedb. am Gr. abgerundet, grün. Fehlt

bei Lu. aber überall in den Wäldern bei Langengrassau, Gehren; F. Drehna! Hier am \*Weinbg. A!

**Pedicularis Tourn.** Käufesraut.

*P. silvatica* L. 5, 6. Mehrere einfache Stg. 3. G. sehr verbreitet: \*Wiesen westl. v. Langengrassau; \*am Fuß der Hölleberge; \*zw. Riedebeck u. Beesdau; \*Bornsd. an der Ziegelscheune; \*zw. Gossmar u. Beesdau; \*Waldwiesen b. F. Drehna; \*Pademagk A. Zw. Zöllmersd. u. Wierigsd. östl. v. Waltersd. am Fuchsteich bei Weissagk!

*P. palustris* L. 5—7. Ein ästiger St. Nicht so häufig als v. N. Torfmoore bei Lu. Wittmannsd. u. Gossmar. Zw. Weissagk u. der Gahroer Bschhütte; Bornsdorfer Teiche!

**Alectorolophus Haller.** Klappertopf.

*A. major* Rchb. 5—7. Stg. schwarzbraun gestrichelt, Dedb. bleich, Ach.röhre gekrümmt. Wiesen bei Lu. Fresd. Görlsd!

*A. minor* Wimm u. Grab. 6, 7. Stg. u. Dedb. grün, Ach.röhre gerade. Nicht selten, z. B. Fresd. Langengrassau!

**Euphrasia odontites** L. 6—10. St. schmutzig rosa, B. lanzettlich gesägt. Nieder u. Wiesen, häufig.

*E. officinalis* L. Augentrost. 7—9. St. weißlich mit violetten Streifen, B. eifg. gezähnt. Tristen, lichte Wälder, gemein.

**Lathraea squamaria** L. Schuppenwurz. 3—5. \*Weissagk beim neuen Quell A.

## 67. Fam. Labiatae Juss.

†**Mentha piperita** L. Pfefferminze. (England). St. in endständiger beschlättiger Aehre. In Gärten gezogen.

**M. aquatica** L. (capitata Wimm.) 6—10. Halbkugeln in den obersten Bl.achseln zu einem endstg. kopfartigen Stgd. zusammengebrängt. Ach.zähne pirienförmig. Frucht D. gemein. Form *sativa* L. am Gokmarischen Fieß!

**M. arvensis** L. 7—10. Halbkugeln sämtlich i. d. Achseln von Laubb. Ach.zähne dreieckig. Gräben, feuchte Nieder, gemein.

**Lycopus europaeus** L. Wolfstrapp. 7, 8. Gräben u. Sumpfränder, häufig. N. St. Lu. am Stadtgraben.

†**Salvia pratensis** L. Salbei. (Südeuropa). 5—7. Pitschen, Kirchhof Rbh.

**Origanum majorana** L. Mairan. (Nordamerika). 7—9. B. ganzrandig, Ach. ungezähnt. In Gärten gebaut.

**O. vulgare** L. Dost. 7—9. B. gezähnt, Ach. 5zähntig. Vereinzelt in d. Rodwauer u. Kemliker Heide Rbh.

**Thymus serpyllum** L. Quendel. 6—9. Stg. am Gr. wurzelnd, niebergestreckt. Tristen, lichte Wälder, gemein.

†**T. vulgaris** L. Thymian. 5,6. Stg. nicht wurzelnd, aufrecht. In Gärten gebaut.

†**Satureja hortensis** L. Pfeffertraut. (Südeuropa). 7—10. Gebaut.

**Calamintha acinos** Clairv. 6—9. Halbquirl in d. Achseln von Laubb. u. von ihnen überragt. Im Cahnstdf. (z. B. am Wall u. an der Calauer Chaussee) viel! \*F. Drehna, Weinbg. A.

**C. clinopodium** Spenner. Wirbeldost. 7—9. Halbquirl von einer Hülle borstlicher, langzottiger Fedb. umgeben. Cahnstdf. am Wall! \*F. Drehna, Weinbg. A.

†**Hyssopus officinalis** L. Ysop. (Süddeutschland). 7—9. Verw. an d. wüsten Kirche vor Bornsd. Rbh.

†**Nepeta cataria** L. Katzenminze. 6—10. Halbquirl am Ende d. Stg. einen gedrängten walzigen St. st. bildend. Ueberall verw. Lu. an der Promenade u. als Unkraut in Gärten! \*Bornsd. a. d. Ziegelscheune A.

**N. glechoma** Benth. Gundermann. 4—6. Alle Halbqu. in d. Achseln von Laubb. Begränder, Gebüsch, gemein.

**Lamium Tourn.** Taubnessel.

1. St. purpurn.

a. **L. amplexicaule** L. 4—10. Obere St. stengelumsfassend, stehend, Kr.röhre ohne Sa.ring. Behauter Boden, nicht selten.

b. St. gestielt, Kr.röhre mit Sa.ring.

**L. purpureum** L. 3—10. Kr.röhre grade, Helm ungestielt. Auf Schutt u. behautem Boden gemein.

**L. maculatum** L. 4—7. Kr.röhre aufwärts gekrümmt, Helm mit 2 Kielen. \*Wierigsd. Mühlfließ! Gehren Schw.

2. **L. album** L. 4—6. St. weiß, Kr.röhre gekrümmt. Häufig.

3. **L. galeobdolon** Crtz. 4—6. St. gelb, Unterlippe mit 3 lanzettlichen, spitzen Lappen. Laubwald bei Uckro; Waltersd.! \*Weissagk, am neuen Quell; \*Gahro, Buchheide A.

**Galeopsis** L. Hohlzahn.

1. Stg. rückwärts fleischig unter den Knoten angeschwollen.

a. **G. versicolor** Curt. (= *G. speciosa* Mill.) 6—10. Kr. gelb, violett gefleckt, von doppelter Achslänge. Nicht selten Rbh.

b. Kr. purpurn, weiß ob. gelb gefleckt, nicht viel über die Achslänge hinausragend.

**G. tetrahit** L. 6—10. Mittellappen der Unterlippe fast vieredig flach. Gemein.

**G. pubescens** Bess. 6—10. Mittellappen länglich, umgerollt.

Lu. in Gärten u. an den Seiten der jüdl. Promenade; Fresdf. im Dorfe; Görlsdf.! \*Bornsd. an der Ziegelei A.

2. *G. ladanum* L. 7—10. Stg. flaumig, unter den Knoten abgesetzt, aber nicht geschwollen. Felder bei \*Paserin A. Uckro; Zöllmersdf. Langengrassau u. F. Drehna!

**Stachys Tourn.** Ziest.

1. *St. röhre* mit *Har. ring*.

- a. *St. von doppelter Ach. Länge.*

*S. palustris* L. 7,8. St. länglich lanzettlich, kurzha. untere sehr kurz gestielt. Feuchte D. häufig. N. St. Vor Zöllmersdf.

*S. silvatica* L. 6—8. St. eig. weichha. untere lang gestielt. Lu. in schattigen Gärten, an Mauern, z. B. im Lössengarten. Zw. Uckro u. Pitschen unweit des Bahndammes; Görlsdf. Gebüsch hinter dem Teich!

- b. *S. arvensis* L. 7—10. St. kaum länger als d. Ach. Bei Uckro; Langengrassau; Wüstermark Rbh.

2. *S. betonica* Benth. 6—8. *St. röhre* ohne *Har. ring*. Zw. Lu. u. Pelkwitz am Fußsteig westl. der Bäfte! \*F. Drehna, Weinberg A. Waldwiesen beim Mittelteich, viel!

**Marrubium vulgare** L. Andorn. 6—10. Dorfstraßen: Cahnsdf. Giessmannsd.!

**Ballota nigra** L. 6—10. Gemein. N. St. Lu. an der Promenade.

**Leonurus cardiaca** L. Herzesblatt. 6—8. In Dorfstraßen häufig. N. St. Lu. Promenade unweit des Gymnasiums.

**Chaiturus marrubiastrum** Rchb. Katzenchwanz. 7,8. Cahnsdf. Wierigsdf. Rbh.

**Scutellaria galericulata** L. Schildkraut. 6—9. Feuchte D. d. d. G. häufig. N. St. Lu. am Gohmarschen Fließ.

**Brunella vulgaris** L. 5—10. *St. röhre* grade. Triften, Wiesen, gemein.

**B. grandiflora** Jacq. 5—10. *St. röhre* etwas aufwärts gekrümmt. F. Drehna, westl. Teil des Weinbergs!

**Ajuga** L. Günsel.

*A. reptans* L. 4—6. Pfl. mit beblätterten Ausläufern. Laubwälder, Wiesen, häufig, z. B. bei Wittmannsd.

*A. genevensis* L. 5,6. u. öfter 8—10. Pfl. ohne Ausläufer. Trockne D. d. d. G. nicht selten. Viel bei Zöllmersdf. u. bei \*Uckro A.

**Teucrium scordium** L. Gamander. 7—10. Uml. Lu. häufig. N. St. Graben nach dem Hain. Ferner Karche; Zaukow; Frankendf. Görlsdf. Garrenchen! Im Hinterbusch Schw. \*Cahnsdf. sogen. Biechweide A.

## 68. Fam. Verbenaceae Juss.

**Verbena officinalis** L. 6—10. In allen Dorfstraßen häufig. Lu. an der Promenade! Cahnsdf. viel A.

## 69. Fam. Lentibulariaceae L.C.Rich.

**Pinguicula vulgaris** L. 5,6. Wiesen zw. Bornsd. Weisagk u. Bergen! \*Am Wege zw. Frankendf. u. F. Drehna Tsch.

**Utricularia vulgaris** L. Wasserichlauch. 6—9. Torfmoore zw. Lu. Wittmannsd. u. Gossmar zu beiden Seiten des Fließes!

## 70. Fam. Primulaceae Vent.

**Lysimachia thyrsiflora** L. 5—7. St. klein in h. winkelförmig. eifg. gebrungenen Trauben. Lu. Torfmoore westl. vom Gossmarschen Fließ, viel!

**L. vulgaris** L. 6,7. St. in endförmig. Rispe. Frucht Gebüsche u. Grabenränder d. d. G. nicht selten. R. St. Lu. Prinzessinnensteig!

**L. nummularia** L. 6,7. St. groß, einzeln i. d. Bucheln, (Stg. kriechend). Frucht D. überall häufig, z. B. Lu. Gräben der Promenaden.

**Anagallis arvenais** L. Gaudheil. 5—10. Mit scharlachroter Kr. d. d. G. häufig! Mit fleischroter Kr. \*Bornsd. bei den Teichen R. Mit weißer Kr. u. violetter Schlundring \*Lu. östl. d. Stadt; ebenso aber kleinblütig bei \*Cahnsdf! Mit lila Kr. \*F. Drehna, Weinbg. Kn.

**Centunculus minimus** L. Kleinling. 6—9. Auf lehmig sandigem Boden zw. Paserin u. Kümmitz, sowie bei Wannenchen Rbh.

**Primula officinalis** Jacq. 4—6. Auf der Westseite von Zöllmersdf. in Gärten zahlreich Tsch.!

**Hottonia palustris** L. Wasserfeder. 5,6. In allen Gräben um Lu. gemein, viel in denen der Torfmoore süd!. der Stadt! \*Vor Beesdau; \*F. Drehna A.

**Samolus valerandi** L. 7—10. Moorboden in d. Kemlitzer Heide Rbh.

**Glaux maritima** L. Milchkraut. 5,6. Viehweide bei Lu.; zw. Cahnsdf. u. Frankendf. an Aedern u. Wiesen häufig Rbh.



## 71. Fam. Plumbaginaceae Juss.

**Armeria elongata** Boissier (*A. vulgaris* Willd.). Grasse. 5—10. Begränder u. trockne Tristen, häufig. N. St. Schanze!

## 72. Fam. Plantaginaceae Juss.

**Litorea uniflora** Asch. Strandling. 6—8. \*Am nördl. Ufer des Sandeichs bei F. Drehna Kn. u. R.

**Plantago** L. Wegerich.

1. Schaft blattlos, einfach, B. grundstbg.

a. *P. lanceolata* L. 5—10. Schaft gefurcht. Wiesen, Alderraine, Begränder, nicht selten.

b. Schaft stielrund.

*P. major* L. Begebreit. 6—10. B. deutlich gestielt, St. grünlich. Tristen, Begränder, gemein. var. *nana* Tratt. (kleiner). \*Sumpf an der Eisenbahn südl. v. Pickel R.

*P. media* L. 5, 6. B. fast stiellos, St. röthlich-weiß, wohlriechend. Nicht selten: N. St. Lu. Prinzessinnensteig u. Chaussee nach Wittmannsdorf!

2. *P. ramosa* Asch. 6—10. Stg. beblättert, ästig. Zw. Wierigsdorf u. Giessmannsdorf. auf der sandigen Trift westl. d. Chaussee!

## 73. Fam. Amarantaceae Juss.

**Albersia blitum** Kth. Rautrich. 7—10. Lu. im O. Schw.

**Amarantus retroflexus** L. Amarant. 7—9. St. grün. Um Lu. ziemlich häufig: Schon in der östl. Vorstadt; auf den Fluren von Karche; Zaakow; \*Cahnsdorf! Zw. Lu. u. Fresdorf. vor u. hinter dem Borchelt; sowie innerhalb der genannten Dörfer!

† *A. paniculatus* L. Fuchsschwanz. (Ostindien). 6—10. St. (oft die ganze Pfl.) purpurn. Nordöstl. u. südöstl. von Lu. bei Karche u. Fresdorf!

**Polycnemum arvensse** L. Snorpelfraut. 7—10. Meßer bei \*Uckro. A. Paserin; Wierigsdorf. Karche; Zaakow (nördl. sehr viel)!

## 74. Fam. Chenopodiaceae Vent.

**Chenopodium** Tourn. Gänsefuß.

A. B. breielig.

1. *C. bonus* Henricus L. 5—8. B. ganzranbig. Dorfstraßen

u. Schutt nicht selten, z. B. Lu. am Gohmarschen Fließwege; Zöllmersdf. Fresdf. Beesdau!

2. B. gezähnt.

a. C. rubrum L. 7—10. St. schweife beblättert. An dnj. D. nicht selten.

b. St. schweife unbesblättert.

C. hybridum L. 7—10. B. am Gr. herzf. nicht bestäubt. Schutt, Dorfstraßen, Gärten, häufig. R. St. Am Gohmarschen Fließwege!

C. murale L. 7—10. B. rhombisch-eif. am Gr. keilf. Sa. glanzlos. An denj. D. häufig.

C. urbicum L. 7—10. B. am Gr. kurz keilf. Sa. glänzend, Stg. grau u. weiß gestreift. \*Paserin Kn.

B. B. nicht edig.

1. B. ganzrandig.

C. polyspermum L. 7—10. B. eif. stachelspitzig, unbestäubt. Lu. in Gärten häufiges Unkraut, z. B. im Logengarten; auf Composthaufen am Gohmarschen Fließ viel! Am Schützenteich Schw. Sonst nicht häufig.

C. vulvaria L. 7—10. B. klein, rhombisch-eif. grau bestäubt. Häufig Rbh.

2. B. gezähnt (wenigstens die unteren).

C. album L. 7—10. B. rautenf. oft klappig, ganze Pfl. weiß mehlig. Häufig.

C. glaucum L. 7—10. B. länglich, oberseits grün, unterseits bläulich weiß. Bei Beesdau Rbh.

†Beta vulgaris L. Runkelrübe. (Südeuropa). 7—9. Gebaut.

†Spinacia oleracea L. Spinat. (Orient). 6—9. Gebaut.

Atriplex Tourn. Melbe.

1. A. roseum L. 7—9. Obere B. sitzend. \*Cahnsdf. viel A.

2. Alle B. gestielt, mehr ob. minder spießf.

A. patulum L. 7—9. B. abwechselnd, nur die untersten fast spießf. Schutt u. Begränder, gemein.

A. hastatum L. 7—9. Untere B. meist gegenstb., alle spießf. Wie vor.

## 75. Fam. Polygonaceae Juss.

†Rheum rhaponticum L. Rhabarber (Südsibirien). 5,6.

B. st. unterseits gefurcht. Zierpfl. in Gärten.

†R. undulatum L. B. st. unterseits nicht gefurcht. B. vor.

Rumex L. Sauerampfer.

1. B. peil- ob. spießf., St. eingeschlechtig.

- Rumex acetosa* L. 5,6. Äußere P. b. herabgebogen, innere mit Schwiele. Wiesen u. gemein.
- R. acetosella* L. 5,6. Äußere P. b. aufrecht, innere ohne Schwiele. Brachäcker, Triften. gemein.
2. *R. anders* geformt, St. zwittrig.
- a. Fr. umhüllende P.b. gezähnt, alle mit Schwiele.
- R. maritimus* L. 7—9. Alle St. in den Stl. verschmälert. Lu. an der Badeanstalt Schw. Cahnstdf. Gräben an der Chaussee nach Calau; Görldsf. Busch! \*Bornstdf. an den Teichen A.
- R. obtusifolius* L. 6—8. Gr.stbg. St. bis 30 cm l. mittlere am Gr. herzf. Schutthaufen, Grabenränder, häufig.
- b. P. b. ganzrandig alle ob. wenigstens eins mit Schwiele.
- R. conglomeratus* Murr. 6—8. Innere P.b. schmal, länglich. An Feuchten D. überall häufig; z. St. Cahnstdf. an der Calauer Chaussee.
- R. crispus* L. 6—8. Innere P. b. wenig länger als br. meist nur eins mit Schwiele, St. am Rande wellig. An dens. D. häufig.
- R. hydrolapathum* Huds. 6,8. P. b. wie vor. aber wenigstens 2 mit Schw. St. flach. An Gräben d. d. G. nicht selten, z. St. zw. Lu. u. Gossmar!
3. *R. aquaticus* L. 7,8. P. b. ganzrandig, schwielent. Nicht häufig. Fresdf. Graben in der Nähe des Borchst!

### **Polygonum L. Anöterich.**

- A. St. breit herz-pfeilfg.
- P. convolvulus* L. 7—10. Pfl. kurzba. wenigbtg. P. b. stumpf getielt. Bebautes Land u. Gebüsch gemein.
- P. dumetorum* L. 7—10. Pfl. zahl. reichbtg. P. b. breit gestielt. Lu. in den Hecken der Promenaden Schw.
- B. St. viel länger als br. am Gr. verschmälert ob. abgerundet.
1. *P. aviculare* L. 6—10. St. zu 2 bis 5 in den A.achsen. Gem.
2. St. in endstbg. bl.losen Ähren.
- a. *P. bistorta* L. 6,7. Stg. einfach, Wzlst. knollig. In Gärten: Wierigsdf. Schw. Lu. Räusch.
- b. Stg. meist ästg. Wz. ob. Wzlst. stielrund.
- a. *P. amphibium* L. 6—8. Pfl. ausbauernb mit wagrecht kriechendem Wzlst. Gemein. var *natans* Mnch. (Stg. flutend, obere St. schwimmend), nicht selten, z. St. nördl. von Lu. im Grenzgraben zw. Viehweide u. Gärten.
- b. Pfl. einjährig mit safriger, senkrechter Wz.
- \* Gelenkscheiden weit abstehend.

†*P. orientale* L. 7—10. Zierpflanze verw. Lu. Schutthausen am Gopinarischen Flicß!

\*\* Gelenkscheiben angebrüdt.

I. Ähren walzig, gedrungen.

*P. persicaria* L. 7—10. Gelenkscheiben mit langen Borstenha. bewimpert. Nicht selten.

*P. lapathifolium* Ait. 7—10. P. u. Ästl. mit gelben Drüsenpunkten bestreut. An feuchten O. z. B. bei Uckro u. Langengrassau!

*P. nodosum* Pers. 7—10. Stg. an den Knoten stark verdicbt, St.trauben verlängert. Gemein.

II. Ähren fadenf. loder.

*P. hydropiper* L. 7—10. B. von brennend scharfem Geschmack, Stg. bis 60 cm. I. P. drüsig punktiert. Um Lu. häufig.

*P. minus* Huds. 7—10. B. nur herb, Stg. fadenf. bis 30 cm. I. P. nicht drüsig. \*Sumpf an der Eisenbahn südl. Pikel A.

†*Fagopyrum esculentum* Mnch. Buchweizen. (Mittelasien). 6—8. Fr. mit scharfen ganzrandigen Ranten. Gebaut.

†*F. tataricum* Gaertn. 7—9. Fr. mit stumpfen, ausgeschweiften Ranten. Unter vor. bei \*Uckro A.

## 76. Fam. Thymelaeaceae Adans.

*Daphne mezereum* L. Kellerhals. 3,4. Feuchte Waldungen bei Langengrassau an den Höllenbergen. Rbh.

## 77. Fam. Elaeagnaceae R.Br.

†*Elaeagnus angustifolius* L. Delweide. (Südosteuropa). 6. Garten im N. von Lu.!

## 78. Fam. Santalaceae R.Br.

*Thesium ebracteatum* Hayne. 5,6. Jede St. nur von 1 Deckst. gestützt. Sichte Waldstellen in d. Höllenbergen u. hinter Gehren! \*Uckro; \*Falkenberg M.

*T. intermedium* Schrad. 6,7. Jede St. von 3 Deckst. gestützt. Bei Drehna Rbh.

## 79. Fam. Aristolochiaceae Juss.

*Aristolochia clematitis* L. Osterluzei. 5,6. In u. an den Heden der Promenaden um Lu. nicht selten; z. B. am Schloßberg!

†**Siphisia macrophylla** Asch. Pfeifenstrauch. (Nordamerika).  
6,7. Zu Laubenbefeidungen angepflanzt.

## 80. Fam. Euphorbiaceae Bartling.

**Euphorbia** L. Wolfsmilch.

1. Drüsen der St.hülle halbmondfg. oder zweihörnig.

a. Samen glatt.

**E. esula** Scop. 5—7. B. über der Mitte am breitesten, nach dem Gr. verschmälert. Unter d. Saatk., an Wegen Rbh. (ohne St. D.)

**E. cyparissias** Scop. B. fast gleichbreit ob. unter der Mitte am breitesten. D. d. G. nicht eben häufig. N. St. Lu. an der Chaussee nach Wittmannsd. \*Weissag A.

b. Samen runzlig ob. punktiert.

**E. peplus** Gaertn. 7—10. B. gestielt, verkehrt eifg. Auf bebautem Boden namentlich um Lu. häufig!

**E. exiguus** Mnch. 6—10. B. linealisch, meist mit etwas breiterem Gr. sitzend. Auf Lehm, nicht selten: Lu. Nieder im D! \*Cahnsd. viel A. Frankend. Fresd. \*F. Drehna, Weinbg. A. \*Bornsd. R.

2. **E. helioscopia** Scop. 6—10. Drüsen der St.hülle abgerundet. Im Lu. die gemeinste Art; u. auch sonst d. d. G. nicht selten.

## 81. Fam. Acalyphaceae Kl. u. Gke.

**Mercurialis perennis** L. Bingelstrauch. 4,5. Uckroer Busch Rbh.

## 82. Fam. Phyllanthaceae Gke.

**Buxus sempervirens** L. Buchbaum. (Thüringen). 3,4. Gezogen.

## 83. Fam. Urticaceae Endl.

**Urtica urens** L. Kleine Brennnessel. 5—10. Bl. eifg. ob. elliptisch. Begründer, Gartenland u. gemein.

**U. dioica** L. Große B. 7—10. B. länglich, zugespitzt, (der Endzahn länger als die übrigen). An ähnl. D. häufig.

**U. pilulifera** L. var **Dodartii** L. Weißl. St.stände kugelfg. lang gestielt, B. fast ganzrandig. Lu. siehe Rbh. Flora.

**Parietaria officinalis** L. Glatkraut. 6--10. Form erecta  
M. u. K. \*Golzig, Gebüſche unweit des Parks u. der  
Berſte viel!

#### 84. Fam. Cannabaceae Endl.

**Cannabis sativa** L. Hanf. (Indien). 7.8. Werm. auf Aeſ-  
tern u. in Gärten, z. B. Lu. am Fließwege nach Fresdf.  
**Humulus lupulus** L. Hopfen. 7—9. Feuchte Gebüſche, nicht  
ſelten, z. B. Lu. Karche; Cahnsdf.

#### 85. Fam. Moraceae Endl.

†**Morus alba** L. Weiſſer Maulbeerbaum. (Orient). 5. Ange-  
pflanzt z. B. Lu. vor dem Lazarett.

#### 86. Fam. Ulmaceae Mirbel.

**Ulmus campestris** L. Ulme, Rüſter. 3,4. St. ſehr kurz geſtielt.  
Häufig angepflanzt.  
**U. pedunculata** Fougereux. Wie vor. 3,4. St. lang geſtielt, hän-  
gend, Fr. zottig gewimpert. Weniger häufig angepflanzt: Pelk-  
witz, Wittmannsdf. etc.

#### 87. Fam. Platanaceae Lestiboudois.

†**Platanus acerifolia** Willd. Platan. 5. Häufig ange-  
pflanzt, z. B. Lu. Promenaden.

#### 88. Fam. Fagaceae A.Br.

**Fagus silvatica** L. Rotbuche. 5. N. St. Lu. im Hain.  
**Quercus robur** L. Stiel- od. Sommeriche. 5. B.st. nicht län-  
ger als die halbe Breite des B.grundes. Gemein.  
**Q. sessiliflora** Sm. Stein- od. Winteriche. 5. B.st. länger als  
die halbe Br. des B.grds. Weniger häufig cult. N. St. Lu. Prin-  
zeſſinnenſteig.

#### 89. Fam. Betulaceae A.Br.

**Corylus avellana** L. Haſelnuß. 2—4. Gemein.  
**Carpinus betulus** L. Weißbuche. 5. Angepflanzt nicht ſelten.  
**Betula verrucosa** Ehrh. Birſe. 4,5. B. taſt Häufig.  
**B. pubescens** Ehrh. 4,5. B. unterſeits in den Aderwinkeln bär-  
tig, in der Jugend neſt Zweigen beha. Bei F. Drehna Rbh.

**Alnus glutinosa** Gaertn. Schwarzerle. 3,4. B. meist gestutzt, am Gr. keilfg. unterseits bläßer grün, kahl (in den Aderachseln härtig). Gemein.

**A. incana** D.C. Weißerle. 3,4. B. zugespitzt, am Gr. abgerundet, unterseits blaugrau, kurzha. Lu. an der Spitze Schw.

## 90. Fam. Juglandaceae D.C.

†**Juglans regia** L. Walnuß. (Orient). 5. Angepflanzt.

## 91. Fam. Myricaceae A.Rich.

**Myrica gale** L. Gagel. 4,5. Die Gagelbestände im südl. Teile d. G. ziehen sich fast ununterbrochen von den Torfmooren bei Trebbinchen u. Bergen, zw. Stiebsd. einerseits u. \*Beesdau, \*Wanninchen andererseits, über den \*Großen Teich (Effenberger) bis in die Gegend von \*Pademagk! Vereinzelt finden sich solche am westl. Rande des \*Parks von F. Drehna, ein ziemlich ausgedehnter Bestand am \*Sandteich vor Tugam Schu.

## 92. Fam. Salicaceae Rich.

**Salix Tourn.** Weide.

Die Weiden des Gebietes sind noch nicht hinreichend untersucht, auch Rbh. giebt aus demselben keinen einzigen St.D. an. Ich beschränke mich daher auf die Angabe der häufigsten mir im Gebiet bekannten Vertreter der Hauptgruppen.

A. Räschen gleichzeitig mit den B. sich entwickelnd, ihre Schuppen einfarbig gelbgrün.

I. **Fragiles Knadweiden.** Räschenschuppen nach d. St.zeit abfallend.

S. alba L. 4,5. B. unterseits seidenha. N. St. Lu. Weg nach der sog. Viehweide!

S. fragilis L. 4,5. B. kahl. Viel zw. Lu. u. dem Friesdorfer Borchelt!

II. **Amygdalina Mandelweiden.** Räschenschuppen bleibend.

S. amygdalina L. 4,5. Häufig angepflanzt.

B. Räschen vor den B. sich entwickelnd, ihre Schuppen an der Spitze anders gefärbt.

III. **Viminalis Korbweiden.** Kapseln fast sitzend. Schläng-zweigige ähre Sträucher.

S. viminalis L. 4,5. N. St. zw. Lu. und dem Hain!

IV. **Capreae Eßl- oder Berstweiden.** Kapseln mit meist auffallend langen (beblätterten) Stl. Steifästige Bäume od. Sträucher.

a. Aufrechte Bäume od. hohe Sträucher:

*S. cinerea* L. 4. Kapselst. wenigstens von Länge der Röhrenschuppe. Von Fresdf. bis Beesdau die gemeinste Art.

*S. aurita* L. 4,5. Kps.st. von halber Länge der Schuppen. Häufig z. B. hinter Riedebeck.

*S. nigricans* Sm. 4,5. B. unterseits kahl od. flaumig, bläulich, aber nicht filzig. Wohl ursprünglich angepflanzt, aber verw. z. B. bei Beesdau.

b. Kleine Sträucher mit unter der Erde kriechendem Hauptstamm; Sand- od. Dünenweiden:

*S. repens* L. 4,5. D. d. G. nicht selten. N. St. Fresdf. am Borchelt! \*Zw. Wanninchen u. Pademagk; am \*Sandteich A.

**Populus Tourn.** Pappel.

1. B. herzeirund, Röhrenschuppen gewimpert.

*P. tremula* L. Espe. 3,4. B. (fast kreisrund), buchtig gezähnt, zuletzt kahl. Häufig.

† *P. alba* L. Silber-B. (Südeuropa). 3,4. B. winklig gezähnt, unterseits filzig. Nicht selten angepflanzt.

2. B. rautenf. od. zedig eirund. Röhrenschuppen kahl.

† *P. pyramidalis* Rozier. Italienische B. (Orient). Äste aufrecht. In Alleen häufig angepflanzt, z. B. Am Schloßberg.

*P. nigra* L. Schwarz-B. 4. Knospen ohne Duft, Äste ausgebreitet. Vielfach angepflanzt.

† *P. balsamifera* L. Balsam-B. (Nordamerika). Knospen harzig balsamisch duftend, Äste w. v. Cahnsdf. Wall Schw.

## B. Monocotyledones.

### 93. Fam. Hydrocharitaceae L.C. Rich.

† *Elodea canadensis* Caspary. Wasserpest. (Nordamerika). 5—8. Fehlt bisher im G.

**Stratiotes aloides** L. Wasserscheere. 5—9. In den Torfsümpfen bei Lu. u. Wittmannsd. häufig!

**Hydrocharis morsus ranae** L. Froschbiß. 6—8. Lu. in allen Gräben, im Schützenteich u. in den Wasserlöchern der Torfmoore häufig! Ebenso bei Wittmannsd. Gossmar; Fresdf. Frankendf. (Moor) Görlsd. Cahnsdf.!



## 94. Fam. Alismaceae L.C. Rich.

**Alisma plantago** L. Frochlöffel. 6—10. Sümpfe, Gräben, gemein.

**Elisma natans** Buchenau 5—8. \*Pfeilschote beim neuen Forsthaufe in der Rochauer Heide W.

**Sagittaria sagittifolia** L. Pfeilkraut. 6—8. Lu. in der Berste, ihren Zuflüssen, sowie in den südl. gelegenen Torfmooren bis Beesdau nicht selten!

## 95. Fam. Juncaginaceae Rich.

**Triglochin palustris** L. Dreizack. 6—9. In G. sehr verbreitet. N. St. Lu. am Gohmarischen Fließ. Sehr viel im Sinterbusch auf dem Fußsteig nach Beesdau; ferner bei Cahnsdf. Egsdf. Frankendf. Langengrassau! \*Bornsd. an den Teichen A.

## 96. Potameae Juss.

**Potamogeton** Tourn. Laichkraut.

**Gruppe 1. Verschiedenblättrige.** Schwimmende B. von den untergetauchten verschieden, nicht lineal.

1. **P. natans** L. 7, 8. B. des St. ftds. alle lederig schwimmend. D. d. G. häufig.

2. B. des St. ftds. denen des Stg. ähnlich, nur die späteren schwimmend. **P. rufescens** Schrad. 6—8. Untergetauchte B. sitzend, am Rande glatt, St. ftd. gleich dick. \*Lu. Fressdorfer Fließ!

**F. heterophyllus** Schreb. (gramineus L.) unterg. B. am Rande scharflich, St. ftd. nach oben meist dicker. \*Bornsdorfer Teiche A. Gräben zw. Cahnsdf. u. Frankendf. (im Moor) viel!

**Gruppe 2. Gleichblättrige.** Die ganze Pfl. untergetaucht, alle B. häutig, nicht lineal.

1. **P. lucens** L. 7, 8. Alle B. gestielt. Großer Graben von Fressdf. über Cahnsdf. Zaakow bis zur Berste!

2. Alle B. sitzend. St. ftd. gleich dick. **P. crispus** L. 5, 6. B. lineal, länglich. Häufig, z. B. im Stadtgraben.

**P. perfoliatus** L. 7, 8. B. eirund, tief herzförmig. Gräben u. Teiche um Lu. Görldsf. Pitschen Rbh.

**Gruppe 3. Grassblättrige.** B. linealisch, grasartig ob. borstenförmig.

1. Aehrenstiele nicht länger als die Aehre.

*P. acutifolius* Lk. 6–8. St. gestülpt plattgedrückt. Gräben u. Teiche um Lu. Görlsd. u. Pitschen Rbh.

*P. obtusifolius* M. u. K. Ranten des Stg. abgerundet. Pickel Rbh.

2. Ährenst. 2–3 mal länger als die Ähre.

*P. pusillus* L. 6–9. Bl. scheiben nicht gespalten. Paserin, Pelkwitz!

*P. mucronatus* Schrad. 6–8. Bl. scheiben bis zum Gr. zweispaltig. Pelkwitz, im Buschgraben! (Bedarf der Bestätigung).

*Zannichellia palustris* L. 5–10. In der Nähe von Lu. Rbh.

## 97. Fam. Lemnaceae Duby.

**Lemna** L. Wasserlinse.

1. Laub scheibenfg. rundlich.

a. Unterseite des Laubes flach.

*L. minor* L. 5. Eine einzige ha. fg. Bl. Gemein.

*L. polyrrhiza* L. 5, 6. 6–7 ha. fg. gebüschelte Bl. Mit vor. nicht selten.

b. *L. gibba* L. 5. Unterseite polsterartig gewölbt, schwammig. Lu. Rbh.

2. *L. trisulca* L. Laub elliptisch, zuletzt gestielt, kreuzweise vereinigt. Nicht selten; um Lu. häufig!

## 98. Fam. Araceae Schott.

**Calla** *palustris* L. 5, 6. Lu. am Gohmarschen Fließ; westl. Wierigsd. viel! Pelkwitz Schw. Langengrassau, Sümpfe am Fuß der Hüllberge! Waltersd. Schw.

**Acorus** *calamus* L. Ralmus. 6, 7. Bornsdorfer u. Weisagker Teiche!

**Typha** *latifolia* L. Rohrkolben. 6, 7. Männl. u. weibl. Kolben dicht zusammenstoßend, baumessig. Nicht selten.

*T. angustifolia* L. 6, 7. Männl. u. weibl. Kolben getrennt, dünner. Bei Uckro Rbh.

**Sparganium** L. Spießkolben.

*S. ramosum* Huds. 7, 8. Stg. aufrecht, ästig. Um Lu. nicht selten: Gräben in den Promenaden, Torfsümpfe im S. Görlsd. südl. vom Teich!

*S. simplex* Huds. 6–8. St. aufrecht, einfach. D. d. G. nicht selten: Lu. in den Torfmooren viel! Cahnsd. Görlsd. Paserin u. a. O.!

*Sparganium minimum* Fr. 6—8. Stg. meist stehend, nur 1 männl. Kolben. \*In den Luckau-Wittmannsdorfer Torfmooren ziemlich verbreitet!

## 99. Fam. Orchidaceae Juss.

### **Orchis** L. Anabenkraut.

1. Knollen ungeteilt, fuglig od. länglich.

a. Oberste Deckb. mit 1 Längsnerven, P.b. helmsfg. gestellt.

O. *morio* L. 5,6. St. purpurrot, Lippe mit 3 kurzen Lappen. D. d. G. häufig, bes. zw. Lu. u. Fresdf. (am Dammweg)! \*Zw. Beesdau u. Gossmar A. Zw. Beesdau u. Bergen! \*Waldwiesen u. Weinbg. bei F. Drehna A. Wüstermarke M. Paserin!

O. *coriophora* L. Banzenordf. 6,7. St. purpurbraun, Lippe tief 3spaltig. Bäfewiesen zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf. viel; Paserin, Wiesen am Bahndamm! \*Langengrassau A. \*Wittmannsd. einzeln! \*Cahnsdf. im S. Görlsdf. Buschwiesen, viel! \*Drehnaer Weinbg. 1864 einzeln Steinberg.

O. *militaris* Huds. 5,6. Lippe in d. Mitte weiß mit purpurnen Sa. pinseln, Mittellappen nach vorn verbreitert. Auf Wiesen zw. Cahnsdf. u. Frankendf. Rbh.

b.O. *laxiflora* Lmk. 6,7. Oberste Deckb. mit 3—5 Nerven, seitl. P. b. abstehend. Wittmannsd. Rbh.

2. Knollen geteilt.

O. *maculata* L. 6,7. Knollen breit handfg., Stg. nicht hohl. D. d. G. vereinzelt: Lu. beiderseits am Gohmarschen Fließ; Paserin viel; Langengrassau; Bornsd. Wanninchen!

O. *latifolia* L. 5,6. Kn. breit handfg. Stg. hohl. Feuchte Wiesen, gemein.

O. *incarnata* L. 5—7. Kn. schmal, länglich. St. von Gr. an verschmälert. Lu. Hinterbusch weisl. von Görlsdf. Fresdf. beim Borchelt; südl. u. süd-östl. von Cahnsdf. im Frankendorfer Moor sehr viel; Bornsd.!

**Gymnadenia** *conopea* R.Br. 5—7. Zw. Zöllmersdf. Wierigsdf. u. Pelkwitz auf allen Wiesen; Paserin; Uckro; Langengrassau; Fresdf. zw. Damm u. Borchelt!

**Platanthera** *bifolia* Rchb. 6,7. Waldblößen bei \*Uckro; \*Wüstermarke M. Langengrassau, an der Sumpfschente u. am Fuß der Söllenberge; bei Wanninchen; zw. Frankendf. u. Drehna am Wege; Drehnaer Weinbg.!

- Epipactis palustris** Crtz. Sumpfwurz. 6–8. Pitschen, Hain am Bahndamm! (Nach Rbh. um Lu. sehr häufig).  
**Neottia ovata** Bluff u. Fing. 5,6. Pfl. grün, mit 2 ungefleckten laubh. Golzig, Nasenplatz vor dem Schießstande. Langengrassau, Gebüsch hinter der Ziegelscheune! F. Drehna Pohle.  
**N. nidus avis** Rich. 5,6. Pfl. bleich, mit schuppenfg. B. \*Gahroer Buchheide, sehr spärlich 1874!  
**Spiranthes spiralis** C. Koch. Dreherche. 8–10. \*Langengrassau, Hutungen am Fuß der Höllenberge, sehr zahlreich! \*Bornsdf. an den Teichen Tsch.  
**Liparis Loeselii** Rich. 5–7. Torfboden bei Duben u. Kaden Rbh.

### 100. Fam. Jridaceae Juss.

- †**Crocus vernus** All. (Süddeutschland). 2–4. Verw. auf Wiesen südl. von Lu.!  
**Iris pseudacorus** L. Schwertlilie. 5,6. B. breit-linealisch. D. d. G. häufig. N. St. Lu. Gräben u. Sümpfe vor dem Hain!  
**I. sibirica** L. 5,6. B. schmal-linealisch. Pitschen Holla.

### 101. Fam. Amaryllidaceae R.Br.

- †**Narcissus poeticus** L. Weiße Narzisse. 3,4. (Süddeutschland). 4,5. In Gärten zuweilen halbwild.  
**N. pseudonarcissus** L. Gelbe Narzisse. 3,4. In Baumgärten verw. bei Pelkwitz; F. Drehna; Görldsf. u. a. O. Rbh.  
**Leucojum vernum** L. Wildes Schneeglöckchen. 2–4. Angepflanzt u. verw. bei Lu. u. Sandow Schw.  
 †**Galanthus nivalis** L. Schneeglöckchen. (Schlesien). 2,3. In Gärten.

### 102. Fam. Smilacaceae R.Br.

- Paris quadrifolius** L. Einbeere. 5,6. Schattige Laubwälder bei Uckro, Langengrassau u. F. Drehna!  
**Polygonatum multiflorum** All. 5,6. St. fl. stielrund. Im Uckroer Busch!  
**P. officinale** All. 5,6. St. fl. kantig. In der Hochauer Heide; Casel, am Wege nach Baldow Rbh.  
**Convallaria majalis** L. Maiblume. 5,6. Golzig, Gebüsch unweit des Schießstandes. (Ohne Blüten!)  
**Majanthemum bifolium** D.C. 5,6. Feuchte Wälder u. Gebüsch, nicht selten: Lu. Poetensteig; Uckro, im Busch!

## 103. Fam. Liliaceae D.C.

†**Tulipa silvestris** L. 4,5. Bern. Lu. Grasplätze nördl. der Stadt Gadegast. Paserin im Pfarrgarten!

**Gagea Salisb.** Goldstern.

1. **G. silvatica** Loudon, (lutea L.). 4,5. Nur 1 Zwiebel, Gr.-blatt plötzlich mühenfg. zugespitzt. Waltersdf. Kr.

2. Mehrere Zwiebeln.

a. **G. arvensis** Schult. 3—5. St. fl. beha. D. d. G. häufig, z. B. Lu. \*Schanze A. Grüner Weg!

b. St. fl. nackt.

**G. spathacea** Schult. 4,5. Unterstes Dedb. den F. fl. mit breiter Basis scheibig umfassend. Sumpfige Waldungen bei Langengrassau Rbh.

**G. pratensis** Schult. 4. unterstes Dedb. wie die anderen, 3 Zwb. Im Lu. nicht selten: \*Umgebung nach S. A. Nördl. am Prinzessinnensteige u. bei Karche; Gossmar, Zöllmersdf.!

**Ornithogalum umbellatum** L. Milchstern. 4,5. Stb. einsch. St. dolbentraubig. In der Umgebung von Lu. nicht selten: Zw. Zaakow u. Cahnsdf. Schw. Fresdf. Felder am Dorstelt; zw. \*Gossmar u. Wittmannsdf. \*Beesdau!

†**O. nutans** L. (Orient). 4,5. Stb. 3spitzig, St. in schlaffer Traube. Vollständig verw. Lu. am Schloßberge!

**Allium** L. Lauch.

1. B. röhrig.

a. †**A. cepa** L. Zwiebel. 6—8. Stg. bauchig aufgeblasen. Gebaut.

b. Stg. nicht aufgeblasen.

**A. vineale** A. 6,7. B. halbstielrund, 3 Stb. hautartig breit. D. d. G. nicht selten, z. B. Cahnsdf. \*Uckro; \*F. Drehna, Weinberg A.

†**A. schoenoprasum** L. Schnittlauch. 6,7. B. stielrund, alle Stb. fadenfg. Häufig gebaut.

2. B. flach ob. rinnenfg. nicht röhrig.

a. **A. oleraceum** L. 6—8. Zwb. ohne W. stoc. Cahnsdf. Alferraine an der Eggsdorfer Grenze; F. Drehna, Weinbg.!

b. Zwb. einem wagrechten W. stoc. angewachsen.

**A. acutangulum** Schrad. 6—8. B. scharf gekielt. Lu. Rbh.

**A. fallax** Schultes. 7,8. B. kiellos. Lu. Rbh.

**Anthericus ramosus** L. Zaunlilie 6,7. Schaft ästig. Heide nördl. von Alt-Sorgefeld; Gehren, auf dem Königsberge; F. Drehna, am Weinbg.!

*A. liliago* L. 5,6. Schaft einfach. Nach Rbh. häufig, aber im G. nicht wieder gefunden. (Vergl. Asch. Beiträge).  
***Asparagus altilis*** Asch. Spargel. 6,7. Gebaut u. verw.

## 104. Fam. Melanthiaceae Batsch.

***Tofieldia calyculata*** Wahlenb. 6,7. An dem Gr.-Mehsow zugewandten Ufer des Sandteiches bei F. Drehna zahlreich!

## 105. Fam. Juncaceae D.C.

(Sp. = Spirre).

### ***Juncus*** Tourn. Vinje.

A. B. lose, runde, spitze Halme, am Gr. mit h.losen Scheiben; Sp. festlich aus dem Halm hervorbrechend.

1. Halm mit Mark erfüllt.

a. Staub.f. 3.

*J. effusus* L. 6—8. Spirre flattrig ausgebreitet. D. d. G. nicht selten an feuchten D.

*J. conglomeratus* L. 6—8. Spirre in einen dichten Knäuel zusammengebrängt. B. v.

b.J. *filiformis* L. 6, 7. Staub.f. 6. Luckau - Fresdorfer Buschwiejen!

2. *J. glaucus* Ehrh. 6—8. Halm röhrig, gerillt, mit Querscheibewänden. Auf feuchtem Lehmboden häufig. Rbh.

B. B. lose Halme mit gr.stbg., scheibigen, d. Halm umfassenden B.

*J. squarrosus* L. 6—8. St. in büschelfg. Trugbolzen. \*Bornsd. an den Teichen R. Ihm F. Drehna nicht selten: Zw. Gr.-Mehsow u. Sandteich; am Gr.=Teich bei Pademagk!

*J. capitatus* Weigel 6—9. Bornsd. Nester am Gr.=Teich!

C. Halm beblättert.

1. B. stielrund, höhl., mit Querscheibewänden.

a.*J. obtusiflorus* Ehrh. 6,7. Halm unten unbeblättert. D. d. G. Rbh.

b. Halm vom Gr. an beblättert.

\**J. silvaticus* Reich. 6,7. Die 3 inneren P.f. länger als die äußeren. Bornsd. an d. Teichen!

\*\* Alle P.f. gleich lang.

*J. lamprocarpus* Ehrh. 7,8. P.f. kurz nachelspitzig. Feuchte Wiesen, Gräben, gemein.

*Juncus alpinus* Vill. 7,8. P.b. stumpf. F. Drehna, an dem Kl.-Mehssow zugev. Ufer des Sandteichs, viel!

2. P. schmal-lineal (borstenf.).

a. *J. supinus* Mnch. 7—10. St. gebüschelt, mit 3 Stöb. Lu. am Gohsmarschen Fließ! \*Bornsdorfer Teiche; \*Sandteich bei F. Drehna A. Uckro, am Bahndamm! var. *uliginosus* Rth. (Stg. niederlegend, wurzelnd.) F. Drehna, Graben im Gehölz vor Pademagk; zw. Wanninchen u. F. Drehna im Quellsgraben bei den Torfstichen!

b. St. mit 6 Stöb., einzeln in Widellähren ob. gabligen Trugbolben.

\* Wj. st. kriechend, Salm zusammengebrüht.

*J. Gerardi* Loisl. 6,7. P.b. etwa so lang als b. länglich ovale, rotbraune Kapsel. Lu. Rbh. (Ohne St.D.).

*J. compressus* Jacq. 6—8. P.b. kürzer als b. zuglige, kastanienbraune Kapsel. Lu. Tristen der sog. Viehweide; von Karche nach \*Schollen am Fußsteige; am Gohsmarschen Fließ!

\*\* Einjährige Isfermjl. Salm stielrund.

*J. bufonius* L. 6—10. P.b. länger als die längliche, rotbraune Kapsel. An feuchten O. überall gemein.

*J. tenageia* Ehrh. 6—8. P.b. kürzer als die zuglige, kastanienbraune Kapsel. Niederlausitz häufig Rbh.

**Luzula** D.C. Astersimse.

1. St. in Ebensträußen.

*L. albida* D.C. (*nemorosa* E. Mey). 5,6. Ebenstr. kürzer als b. Süßb., St. weißlich. \*F. Drehna, im Park, (eingeschleppt). A.

*L. pilosa* Willd. 4,5. Ebenstr. länger als b. Süßb. \*Gahroer Buchheide A. Wälder bei Altsorgefeld u. Wanninchen!

2. St. in rundlich-eifg. ob. länglichen Aehren ob. Köpfchen.

*L. campestris* D.C. 3,4. Salm mit Ausläufern. Gemein.

*L. multiflora* Lej. (Vielleicht nur var. der vor.) 4,5. Salm ohne Ausläufer, Pfl. dicht-rasig. Lu. hinter dem Schützenhause!

## 106. Fam. Cyperaceae Juss.

**Cyperus** *flavescens* L. 7—10. Narb. 2, Stg. stumpfzantig. \*Langengrassau, feuchte Tristen am Fuß der Höllebnge! \*Bornsdf. Gr.-Teich A.

*C. fuscus* L. 7—10. Narb. 3, Stg. scharfzantig. Langengrassau mit vor.! \*Sumpf an der Eisenbahn südl. von Pickel; Bornsdf. Gr.-Teich A.

*Schoenus nigricans* L. Knopfried. 6,7. Auf Torfboden in der Gegend von F. Drehna Rbh.

*Rhynchospora alba* Vahl. 7,8. W. faserig, blühende Aehrchen weißlich. Langengrassau, am Fuß der Höllebge. Grönland.

\*Am Sandteich bei F. Drehna R. Torfmoore zw. Wanninchen u. Stiebsdf.; am Gr.-Teich bei Pademagk; Moore u. Teiche zw. Pademagk, Presenchen u. F. Drehna!

*R. fusca* R. u. Sch. 6,7. W. stock kriechend, blüh. Aehrchen braun.

\*An der Nordseite des Sandteiches R. Torfmoore u. trockenliegende Teiche zw. F. Drehna, Presenchen u. Pademagk; am Gr.-Teich!

*Cladium mariscus* R.Br. Schneidegras. 6,7. Im Frankendorfer Moor ein dichter Bestand von ziemlicher Ausdehnung!

*Scirpus* L. Simse.

A. Ein einziges, endständiges Aehrchen.

1. Narb. 2, Aehrchen vielbtg. [Scheiden ohne B.fläche.] *Heleocharis* R.Br.

*S. ovatus* Rth. 7,8. Pfl. dicht-rasensg. Gr. scharfrandig. var. Heuseri Uechtr. Bornsdorfer Gr.-Teich A.

*S. paluster* L. 5—8. Pfl. mit Ausläufern kriechend, Gr. abgerundet. Masse D. gemein.

2. Narb. 3, Aehrchen 3—7btg.

a. *S. caespitosus* L. 5,6. Pfl. dicht rasensg., oberste Scheibe mit kurzem linealen B. Häufig Rbh. (?)

b. Pfl. mit Ausläufern kriechend.

*S. pauciflorus* Lightf. 5,6. Stg. rund. Sumpfige, feuchte D.: Viehweide bei Lu. welche oft damit überzogen ist Rbh.

*S. acicularis* L. 6—10. Stg. kantig, borstensg. Lu. Gräben u. Torfmoore westl. vom Gohmarischen Fließ; Cahnstdf. Graben an der Liebbener Chaussee! \*Bornsdorfer Teiche A.

B. Aehrchen in trugbolbigen Büscheln seitlich unterhalb der Spitze des durch das emporgerichtete Hüllb. verlängerten Palmes.

1. Pfl. bis 15 cm. hoch, Dedb. nicht ausgerandet.

*S. setaceus* L. 7,8. Aehrchen einzeln, zu 2 ob. 3, Stg. sehr fein, Hüllb. kürzer als der Palm. \*Sumpf an d. Eisenbahn südl. von Pickel; \*Gr.-Teich bei Bornsd. A.

*S. supinus* L. 7,8. Aehrchen büschlig gehäuft, Stg. kräftiger, Hüllb. fast so lang als d. Palm. F. Drehna Rbh.

2. Pfl. höher, Dedb. ausgerandet (mit Stachelspitze).

*S. lacustris* L. 6,7. Grasgrün, Narb. 3, Hülge glatt. Fast in allen Teichen d. G.



*Scirpus Tabernaemontani* Gmel. 67. Graugrün, Harb. 2, Älge punktiert. Zw. Lu. u. Cahnsdf. am Wege u. auf den Fließwiesen nach Gossmar zu Rbh.

C. Mehrchen in deutlich endständigen aufrechten Spirren.

*S. maritimus* L. 6—8. Stg. breitkantig. In der Bäfte zw. Zöllmersdf. u. Wierigsdf.! \*Cahnsdf. Graben der ehemal. Viehweide A. Graben süd-östl. am Dorf; Teiche westl. von F. Drehna! Bornsd. Gr.-Teich A. var. *compactus* Hoffm. (Mehrchen sämtlich sitzend). Gräben am Frankendorfer Moor!

*S. silvaticus* L. 5,6. Stg. rundlich. Nicht selten: Lu. 3. B. am Gohmarschen Fließ; Görlsd. Umgebung des Teiches; F. Drehna, Ziegelteich!

D. *S. compressus* Pers. 6,7. Mehrchen in zweizeiliger Reihe. Triften bei Cahnsdf. nach Frantendorf. zu! Pademagk A.

### **Eriophorum** L. Wollgras.

1. *E. vaginatum* L. 4,5. Nur ein [endständiges] Mehrchen. In allen Torfmooren zw. Bornsd. Beesdau, Wanninchen, Pademagk u. Presenchen einerseits u. F. Drehna andererseits! \*Waldsümpfe süd. vom Sandteich A.

2. Mehrere ungleich lang gestielte Mehrchen.

*E. polystachium* L. 4,5. Stg. rundlich, Mehrchenst. glatt. In den Torfmooren des g. G. häufig.

*E. latifolium* Hoppe. 5,6. Stg. 3seitig, Mehrchenst. fein rückwärts rauh. Waldsümpfe am Sandteich bei F. Drehna Schw. Bornsd.!

**Carex Micheli** Segge. Rietgras. (Schl. = Schläuche des fruchttragenden Mehrchens).

**Gruppe I. Psyllophora.** Eine einzige einfache Reihe am Ende des fast nackten Stängels; kein Hüllb.

*C. dioeca* L. 4,5. Hüll. 2häufig, Deckb. bleibend. Sümpfe u. Torfwiesen bei Waltersdf. Bornsd. zw. Wanninchen, Stiebsdf. u. F. Drehna Rbh.

*C. pulicaris* L. 5. Reihe am Gr. weibl. an der Spitze männl. Deckb. abfallend. Bei Bornsd. Rbh.

**Gruppe II. Schellhameria.** Ein aus kleinen Mehrchen zusammengefügtes Köpfchen an d. Spitze des Schaftes.

*C. cyperoides* L. 6—9. \*Bornsdorfer Gr.-Teich A. \*Erlenbruch westl. von Beesdau Kr.

**Gruppe III. Vignea.** Ein aus kl. wenigbtgen. Mehrchen zusammengefügter Ähriger ob. rispiger St. st. [2 Harb.].

A. *C. disticha* Huds. 5,6. Obere u. untere Mehrchen ganz weibl.,

mittlere ganz männl. Zerstreut an Gräben u. auf sum-  
pfigen Wiesen um Lu. z. B. Grenzgraben nach Fresdf.  
vor Zaakow; am Goshmarschen Fließ!

B. Mehrchen an d. Spitze männl. am Gr. weibl.

1. C. arenaria L. 5,6. Wj.stod kriechend, Ausläufer treibend.  
Sandhügel hinter Gohren! (Im Lu. fehlend!)

2. Wj.stod ohne Ausläufer, Schl. mit Zähnig. gesägtem Schnabel. (Acrar-  
rhenaë).

a. Mehrchen eine zusammengesetzte Aehre bildend.

C. vulpina L. 5,6. Flächen des scharf 3kantigen Halms concav.  
D. d. G. nicht selten, bes. häufig um Lu. N. St. Grä-  
ben nördl. der Stadt.

C. muricata L. 5,6. Flächen des 3kantigen S. eben. Im Lu.  
gemein an Gräben u. sumpfigen D. N. St. Desfl. Weg  
nach dem Hain! \*Drehnaer Weinbg. A. var. virens  
Lmk. (Aehre etwas unterbrochen, Deckb. weißlich).  
\*Nasenplätze des Drehnaer Parks, einzeln, einge-  
schleppt A.

b. Mehrchen rispig gestellt.

\* Flächen des Halmes nicht gewölbt.

C. paradoxa Willd. 5,6. Rispe dicht, länglich mit aufrechten  
Aesten; ein Faserköpf am Gr. des Stg. \*Torfmoore zw. Lu.  
u. Wittmannsd. ein reicher Bestand hinter der Luckau-  
Gossmarschen Grenze, östl. vom Fließ!

C. paniculata L. 5,6. Rispe locker, rhombisch mit abstehenden  
Aesten. \*Torfmoore bei Lu. Wittmannsd. u. Fresdf.  
bes. viel weibl. vom Goshmarschen Fließ, unweit dessel-  
ben; Paserin viel; Bornsd. Weissag; Bergen;  
F. Drehna, hinter d. Sandteich!

\*\*C. diandra Rth. (teretiuscula Good). 5,6. Der oberw.  
3kantige Stg. mit schwach gewölbten Flächen, Schl. länger als d.  
kurz zugespitzten Deckb. D. d. G. Rbh.

C. Mehrchen an der Spitze weibl. am Gr. männl.

1. Wj.stod weit kriechend, Halme einzeln, (in 1 Reihe gestellt).

C. brizoides L. 5,6. Mehrchen glänzend, weiß-gelb, geträumt.  
In den Niederl. selten: Golzig Rbh.

C. praecox Schreb. (Schreberi Schrk.) 4,5. Mehrchen  
dunkelbraun, grade. Häufig Rbh. (Vergl. Asch. Beiträge).

2. Wj.stod faserig, rasenbildend. Hyparrhenae Fr.

a. Mehrchen genähert, ohne Hüllb. eine lockere Aehre bildend.

\* C. leporina L. 5,6. Schl. an d. Nieten geflügelt, so lang als  
die Deckb. D. d. G. häufig, z. B. vor Pelkwitz viel; bei  
Cahnsd. Frankend. Fresdf. im Winterbusch auf dem  
Fußsteig nach Beesdau ganze Flächen überziehend;

Beesdau; Trebbinchen; Bornsd. \*Wittmannsd. im Mittelbusch!

\*\* *Ähl.* nicht geflügelt, länger als d. eifz. spitzlichen Deds.

C. *echinata* Murr. 5,6. B. schmal, starr, kürzer als d. *Ätg.* Aehrchen 3—5. Waldsümpfe d. d. G. nicht selten: Langengrassau, Fuß der Hölleberge; Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, in der Gasse u. hinter d. Sandteich!

C. *elongata* L. 5,6. B. schlaff, so lang als d. raue *Ätg.* Aehrchen 8—12, graugrün. Grabenränder bei Holzig am Park; Pelkwitz, im Busch; Weissagk, hinter dem Fuchsteich; \*F. Drehna östl. am Park!

C. *canescens* L. 5,6. B. schlaff, so l. als d. nur oben raue *Ätg.* Aehrchen 4—6, graugrün. Nicht selten: Torfmoore bei Lu. u. Wittmannsd. östl. von Pelkwitz; bei Langengrassau; Waltersd. zw. \*Gossmar u. Beesdau!

b. C. *remota* L. 5,6. Alle Aehrchen, od. doch die untersten weit von einander entfernt, wenigst. d. unterste mit Hüllb. Sehr verbreitet: \*Sumpf an der Eisenbahn süd. Pickel A. In großen Beständen in den lichten Laubwaldungen östl. Paserin; im \*Uckroer Busch; bei \*Langengrassau; Waltersd. Gehren, Gebüsche an den Mühlgräben; Weissagk, am Fuchsteich; zw. Görlsd. u. Wanninchen hinter dem Teich sehr viel; Wanninchen, unweit d. Mühle; F. Drehna, im S.W.!

**Gruppe IV. Eucarex.** Aehrchen getrennten Geschlechts, die endstg. männl. die unteren weibl. meist gestielt.

A. *Colobostomae.* Ähl. ungeschnäbelt od. mit sehr kurzem gestuften Ähn.

1. Narben 2.

a. Fr. tragende *Ätg.* am Gr. ohne Laubb. (nur vorjährige Scheiben).

C. *stricta* Good. 4,5. *Ätg.* steif, Ähl. mit 5—7 Nerven. Um Lu. häufig, z. B. Schüppenteich; Frosdorfer Fließ u. Torfmoore!

C. *caespitosa* L. 4,5. *Ätg.* dünn u. schlaff, Ähl. nervenlos. An sumpfigen O. überall gemein Rbh. (?)

b. Fr. tragende am Gr. mit Laubb.

C. *gracilis* Curt. (*acuta* L.) 4,5. *Ätg.* weit herab rauh, Tragb. des untersten Aehrchens die obersten überragend. Gräben, Ufer, gemein; N. St. vor dem Hain!

C. *Goodenoughii* Gay. (*vulgaris* Fr.) *Ätg.* nur oberwärts rauh, Tragb. des untersten Aehrchens nicht länger als dieses. Feuchte Wiesen, Ufer, gemein. var *juncella* Fr. 2. *chlorostachya* Rchb. (schlank, Deds. sehr kurz.) Bismlich

verbreitet: Gräben nördlich von Lu.; an der Chaussee nach Calau vor der Ziegelei; Fresdorfer Fließ. \*Großer Graben zw. dem Vorchelt u. Gossmar; Graben zw. Vorchelt u. Fresdf.!

## 2. Narben 3.

a. *C. Buxbaumii* Wahlb. 5,6. Endährchen keulenfg. an d. Spitze weibl. die übrigen männl. Fresdf. Vorcheltwiesen Rbh.

b. Endährchen ganz männlich.

\* Schl. kahl.

§ Tragb. des untersten Aehrch. nicht ob. sehr kurz scheibig.

*C. supina* Wahl. (obtusata Lilj.) 4,5. Tragb. eine breit eiz. lanzettliche Schuppe mit grünem Rücken. Auf sonnigen Hügeln bei Weissagk Rbh.

*C. pallescens* L. 5,6. Tragb. laubb.artig, die Aehre überragend. Pelkwitz, Busch; Görlsd. Busch; feuchte Waldstellen am Wege von Langengrassau nach Kemnitz (in den Hölleubg.); Weissagk, hinter dem Fuchsteich; F. Drehna, hinter d. Ziegelei u. östl. vom Park nach dem Weinbg. zu; hinter dem Sandteich; Gahroer Heide!

*C. limosa* L. 5,6. Tragb. borstentfg. zart, kürzer als d. Aehre. Auf Torfboden bei Duben Rbh.

§§ Tragb. mit Scheibe, Stg. am Gr. von flachen, ziemlich steifen Laubb. umgeben. Pfl. glatt graugrün.

*C. flacca* Schreb. (glauca Scop). 5,6. Das unterste Tragb. kurzscheibig, länger als der g. St. ft. Im Lu. häufig: Brinzelstunnensteig, Torfwiesen; Calnsdf. an dem der Eggsdorfer Grenze zustrebenden Graben mit dichtbst. gen weibl. Aehren; zw. Zöllmersdf. u. Langengrassau! zw. \*Gossmar u. Beesdau; \*Weinbg. bei F. Drehna A.

*C. panicea* L. 4,5. unterstes Tragb. langscheibig, nie das oberste Aehrchen erreichend. D. d. G. gemein, bes. auf den Torfwiesen südl. von Lu.!

\*\* Schl. fein beha. dreiseitig.

§ Tragb. deutlich scheibig, ohne B. fläche, untere Seitenährch. gest.

*C. digitata* L. 4,5. \*Gr.-Mehssow im Tannenbusch Gahroer Buchheide Kr.

§§ Tragb. nicht ob. sehr kurz scheibig, weibl. Aehrch. sitzend.

I. unterstes Tragb. laubartig.

*C. pilulifera* L. 4,5. Pfl. dicht rasentg. Grafige Waldstellen d. d. G. nicht selten: \*Babbener Steinbrücke A. Lu. am westl. Abhang der Thongruben; Langengrassau; zw. Beesdau u. Stiebsdf. am Wege; Weissagk am Fuchsteich!

*Carex tomentosa* L. 4,5. Pfl. mit verlängerten Ausläufern kriechend. Am Grenzgraben zw. Cahnsd. u. Frankend. hinter der Ziegelei!

**II. Unterstes Tragb. trodenhäutig.**

a) Pfl. dicht rasenfg. B. schlaff, weich.

*C. montana* L. 4,5. Hügel, Wälder, fast überall Rbh. (?)

b) Pfl. Ausläufer treibend, B. steif, meist oberseits rauh.

*C. ericetorum* Poll. 3,4. Palm am Gr. purpurn beschleibt, Dedb. mit breitem weißen Hautrande. Nicht selten: Lu. auf der Schanze! \*Höhenzug hinter Langengrassau (Höllenberg) Waltersd. (Strubebg.); \*Weissagker Kalkgruben; \*Babbener Steinbrüche A.

*C. verna* Vill. (praecox L.) Untere Scheib. hellbraun, Dedb. ohne ob. mit schmalem Hautrande, (weibl. Ähren getrennt). Um Lu. sehr häufig, z. B. \*Schanze A. Auch sonst im G. häufig z. B. \*Höllenberg. A.

**B. Odontostomae.** Schl. mit zahnigem Schnabel. (Tragb. laubartig.)

1. Zähne des plan-convergen Schn. grade ausgestreckt, B. scheiden nicht netzfaserig.

a. Weibl. Ährch. dichtbig aufrecht, Schn. am Rande fein rauh. Fulvella, \*

B. scheiden mit trodenhäutigem Anhängsel. [B. Häutchen].

*C. distans* L. 5,6. Pfl. graugrün, Dedb. spitzig. Besonders verbreitet: Lu. Graswege u. Grabenränder nördl. der Stadt; weisl. Zöllmersd. an der Bäfte; Cahnsd. Grabenränder im O. sehr viel, stellenweise fast 1 m. hoch. Frankend. den Weg durch das Moor überziehend; zw. Görlsd. u. Wanninchen hinter dem Teich!

*C. fulva* Good. 5,6. Pfl. hellgrün, Dedb. stumpf. Feuchte Wiesen u. Sümpfe d. d. g. Niederl. Rbh.

\*\**C. flava* L. 5,6. B. scheiden ohne Anhängsel. In 3 Formen:

a. *vulgaris* Döll. (Stg. steif, spitzig.) Nicht häufig: Im Busch zw. Pademagk u. F. Drehna; Langengrassau, moorstige Gebüsch am Fuß der Höllenberg; F. Drehna südl. am Sandteich!

b. *lepidocarpa* Tausch. (Stg. schlaff stumpf.) Häufiger: Wiesen zw. Lu. u. Beesdau, bei Cahnsd. im Frankendorfer Moor; Waldsümpfe bei Langengrassau (am Wege nach Kemnitz); Busch zw. Pademagk u. F. Drehna mit vor.; Waldsümpfe hinter Wanninchen!

c. *Oederi* Ehrh. Stg. kürzer als die sehr schmalen B. bis 10 cm h. In den Torfsümpfen südl. von Lu. sehr viel; ebenso im Frankendorfer Moor u. im Görls-

dorfer Busch! \*Bei Beesdau; an den \*Borns-  
dorfer Teichen A.

C. *fulva* × *flava* am Fußfußgraben des Sandteichs bei  
F. Drehna! (Bastard).

b. C. *silvatica* Huds. 5,6. Weibl. Ahrsch. schlant, loder, Stg.  
reich beblättert, schlaff. Teich bei Gr.-Mohssow; Wan-  
ninchen Rbh.

2. Zähne linealisch zugespitzt, von einander abstechend. V. u. V. scheiden  
durch Quernerven gegittert.

a. C. *pseudocyperus* L. 5,6. 1 männliches Ahrsch. ziemlich  
verbreitet: In gr. Beständen östl. von Paserin; häufig  
i. d. Torfmooren bei Lu. namentlich an der Grenze  
zw. Lu. u. Gossmar bis Fresdf. hier vielfach das  
Endährsch. in d. Mitte weibl. \*Beesdau, Busch!

b. Mehrere männliche Ahrschen.

\* Stg., V. und Schläuche lat. l. (*Vesicariae*).

§ Schl. beträchtlich länger als die stummen Dack.

C. *rostrata* With. 5,6. Stg. stumpfzantig, Schl. fast kugelfg.  
Nicht selten: \*Lu. Torfmoore, namentlich westl. vom  
Großmarischen Fließ; Sümpfe bei Uckro u. Paserin;  
um F. Drehna! Var. *latifolia* Asch. (V. ziemlich breit,  
oft flach). \*Lu. Torfmoore am Großmarischen Fließ!

C. *vesicaria* L. 5,6. Stg. scharfzantig, Schl. kegelfg. Verbrei-  
tet: \*Lu. überall an Gräben u. Sümpfen; zw. Goss-  
mar, Waltersdf. u. Göhren die gemeinste Art! \*Pa-  
demagk A.

§§ Schl. kürzer od. wenig länger als die zugespitzten Dack.

C. *spadicea* Rth. (*paludosa* Good.) 5,6. V. scheiden mit  
Kasernen, Schl. länglich eifg. auf. gedrückt kantig. Ufer, Grä-  
ben, Torfwiesen süd. von Lu. nicht selten. z. V. an  
der Grenze nach Gossmar!

C. *riparia* Curt. 5,6. V. scheiden ohne Kasernen, Schl. ei-kegelfg.  
beiderseits gewölbt. Bei Lu. am Großmarischen Fließ u.  
unweit der Grenze nach Gossmar; im Mittel- u. Hin-  
terbusch; am Poetensteig; Graben an der Burg, u. a. D.

\*\* Schläuche behaart. *Lasiocarpae*.

C. *filiformis* L. 5,6. Tragb. nicht od. kurz scheibig Vst. schlant,  
bis 1m hoch. In den Torfsümpfen süd. von Lu. ziem-  
lich verbreitet, u. zwar von \*Wittmannsd. bis Goss-  
mar u. Fresdf. Hier namentlich im gr. Graben vom  
Vorchelt zum Hinterbusch häufig; süd-östl. von Cahnstd.  
N. St. Graben zw. Lu. u. Fresdf. halbwegs zum  
Vorchelt!

*C. hirta* L. 4—6. untere Tragb. mit langer beha. Scheide, Pf. straff, 20—50cm hoch. Wiesen, Grasplätze, gemein.

## 107. Fam. Gramina Juss.

Jede St. besitzt außer dem in 2 Schüppchen umgewandelten B. ein Borb. (obere Kronspelze) und steht in der Achsel eines Deth. [untere Kronspelze], deren unterste, unfruchtbare Hüllb. [Kelspelzen] sind. B. = Kalm, A. = Ähre, A. = Ähren.

**Oryza clandestina** A.Br. Reis. 8—10. \*Reich an der Bornsdorfer Ziegelschne A. Lu. Schüppenteich (1881 zu voller St. entwickelt)! Gräben südwestl. davon Schw.

†**Phalaris canariensis** L. Kanariengras. (Südeuropa). 6—10. Verm. auf Schutt am Gohmarischen Fließ! u. Schw.

**Digraphis arundinacea** Trin. Glanzgras. 6,7. Gräben, nasse Wiesen, häufig. var. *picta* L. Bandgras. In Gärten u. verw.

**Anthoxanthum odoratum**. Ruchgras. 5,6. Trockne D. häufig.

†**Zea mays** L. Türkischer Weizen. (Amerika). 7—10. Gebaut.

**Panicum** L. Hirsegräser.

1. Ährch. am Gr. ohne Vorsten.

a. Ae. in fingerfg. genäherten Ae. am Ende des H.

*P. lineare* Kroker. 7—10. B. u. V. scheiden kahl. Nicht selten: z. B. Cahnsdf. am Lerpter Wege!

*P. sanguinale* L. 7—11. B. u. V. scheiden beha. Feuchtes Gartenland, häufig. In Gärten um Lu. ein lästiges Unkraut. Var. *ciliare* Retz. Lu. Gr. Schanze Rbh.

b. *P. crus galli* L. 7—10. Ae. in einseitigen, rispig gestellten Schein-Ae. Auf Aedern häufig, z. B. bei der Schanze!

c. *P. miliaceum* L. Hirse. 6—9. Ae. lang gestielt in zus. gef. Rispe. Gebaut.

2. Ährchen am Gr. mit grannenfg. Vorsten.

*P. verticillatum* L. Klebgras. 6—9. Vorsten rückwärts rauh, haftend. Auf der Südseite von Lu. an den Hecken der Promenaden u. in Gärten als Unkraut! \*Am Fließwege nach Fresdf.!

*P. viride* L. 6—10. Deth. u. Borb. fein punkterit, Vorsten grün. Auf bebautem Boden häufig.

*P. glaucum* L. 7—10. Deth. u. Borb. querrunzig, Vorsten suchfg, Rarb. purpurn. Lu. Aeder am Fließwege nach Fresdf.; Cahnsdf. nördl. vom Altenower Fußsteige, stellenweise die Aeder überziehend, ebenso südl. von Falkenberg!

**Dactylus officinalis** Vill. 7—9. F. Drehna. Weinbg. Rbh.

**Milium effusum** L. Waldhirse. 5,6. Laubwäldungen, häufig Rbh.

**Nardus stricta** L. Borstengras. 5,6. Unfruchtbare Tristen, d. d. G. nicht selten, z. B. \*Uckro A. Langengrassau; zw. Gossmar u. Riedebeck! \*Bornsdf.; \*zw. F. Drehna u. Pademagk A.

**Phleum pratense** L. Storchgras, Timothee. 6,7. Achse des Ae. h. nicht älter d. St. verlängert. Wiesen, Begränder, häufig.

P. **Böhmeri** Wib. 6,7. Achse des Ae. h. etwas über d. St. verl. zw. Lu. u. Zaakow auf Meserrainen, Schw. Zöllmersdf. unweit d. Chaussee; am Wege nach Pelkwitz; F. Drehna, Weinbg.!

**Alopecurus** L. Fuchsschwanz.

1. A. **pratensis** L. 5,6. Stalm aufrecht. Wiesen, häufig.

2. Stalme mehrere, knidig aufstrebend.

A. **geniculatus** L. 6—10. Granne unter d. Mitte des Deckb. eingefügt, die Hülb. überragend. Nicht selten: N. St. Graubentränder vor dem Hain!

A. **fulvus** Sm. 6—10. Granne in od. über d. Mitte des Deckb. eingefügt, die Hülb. kaum überragend. Mit vor. nicht selten u. vielleicht nur var. derjb. \*Bornsdf. Gr.-Teich A.

**Agrostis** L. Windhalm.

1. Von den Hülb. das untere länger.

a. V. alle flach.

A. **vulgaris** With. 6,7. St. häutchen kurz. Häufig.

A. **alba** L. 6,7. St. häutchen lang. Häufig. N. St. Hainwiesen!

b. A. **canina** L. 6,7. unter N. borstlich, St. fehlend od. sehr klein. Moorwiesen d. d. Rbh.

2. A. **spica venti** L. 6—8. Oberes Hülb. länger. Unkraut auf Meßern, bei. auf feuchtem Sand.

**Calamagrostis lanceolata** Rth. 6,7. Granne endstbdg. Lu. Grabenränder des Moores süd. vom Schützenhause Schw.!

C. **epigea** Rth. Schilf. 6,7. Granne rückenstbdg. Görlsdf. süd. u. süd-östl. vom Teich, viel; F. Drehna, an der Gasse u. am Weinbg.!

C. **arundinacea** Rth. 6,7. Granne gr. ähnl., gekniet, Ae. h. achse über d. St. verlängert. Kemlicher Heide Rbh.

**Holcus lanatus** L. Honiggras. 6—8. W.; faserig, St. scheiden rückwärts dicht beha. Trockne Wiesen, gemein.

H. **mollis** L. 6—8. Gr. achse kriechend, obere St. scheiden fehl. Auf waldbegrenzten Feldern verbreitet: Nördl. von Zaakow; östl. von Cahnsdf.; am u. im Busch vor Pelkwitz; zw. Pelkwitz u. Zöllmersdf.; westl. von Langengrassau!



\*Wüstermarke, am Utkroer Fußsteig Grönland. F. Drehna, am Wege nach Gr.-Mehssow!

**Avena L. Hafer.**

A. A. elatior L. Franz. Rauhgras. 6,7. Untere St. mit verkümmerten Fr. Knoten. D. d. G. nicht selten, auch auf Wiesen angehäuft.

B. Alle St. zwittrig.

1. A. h. nach dem Verblühen hängend, Hüllb. 5—9 nervig.

a. Stachse zahl, (am Gr. der St. büßlich beha.)

A. strigosa Schreb. 6—8. Dedb. mit rüdenstbgr. geknieter Granne. Zw. Wüstermarke u. Waltersdf. unter A. sativa Grönland.!

†A. sativa L. 6—8. Dedb. der oberen St. grannenlos. Gebaut.

b.A. fatua L. Windhafer. 6—8. Stachse u. untere Hälste des Dedb. rauha. Unter Feldfrüchten um Lu.!

2. Ährchen nicht hängend, Hüllb. 1—3nervig.

A. pubescens L. 5,6. B. kurzst. Wiesen, Hügel, Waldblößen: Lu. Müllerhach u. Prinzessinnensteig; Cahnsdf. Wall; zw. Lu. u. Fresdf. viel! \*F. Drehna, Park u. Weinbg. A.

A. pratensis L. B. zahl. Rbh. (ohne Standort).

**Trisetum flavescens P.B.** Goldhafer. 6. Lu. Prinzessinnensteig; um Niechß Vorwerk! Poetensteig; Cahnsdf, Wall Schw.

**Aera L. Schmiel.**

1. Pfl. klein, bis 15cm hoch.

A. caryophylla L. 5,6. Rispe ausgebreitet. \*Uckro A. Hinter Langengrassau in den Hüllenbergen!

A. praecox L. 4,5. Rispe zusammengezogen, ährenfg. \*Uckro, mit Moenchia sehr viel A. Häufig in der Falkenberger u. Kemlitzer Heide!

2. Pfl. über 30cm hoch.

A. flexuosa L. 6,7. B. borstenfg. Langengrassau, in den Hüllbn., viel! zw. Görlsdf. u. Wanninchen Schw. Wüstermarke, Rochauer Heide!

A. caespitosa L. 6,7. B. flach mit oberwärts stark vortretenden sehr ranzen Nerven. Um Lu. häufig. N. St. Hainwiesen; ferner Cahnsdf. Langengrassau, Tristen hinter der Ziegelei!

**Weingaertneria canescens Bernh.** 6,7. Unfruchtbare Tristen, dürre Kiefernwälder, häufig.

**Sieglingia decumbens Bernh.** Dreizahn. 6,7. Sehr verbreitet: Cahnsdf. feuchte Rasenplätze an der Chaussee nach

Lübben; Langengrassau, in den Höllenbergen; Wüstermarke, an der Chaussee nach Schlieben; um F. Drehna!

*Arundo phragmites* L. Rohr. 7—9. D. d. G. häufig.

*Molinia coerulea* Mch. 7—9. D. d. G. nicht selten: Bei Lu. am Fresdorfer Fließ; um F. Drehna, namentlich im Ed. (in der Gasse) u. W. (am Wege nach d. Weinbg)! Var. *arundinacea* Schrk. (sehr hoch mit grünl. Kehrchen in weniger schlanker Rispe). Gebüsche am Fresdorfer Fließ!

*Melica nutans* L. 5,6. F. Drehna, Gebüsche in der Umgebung des Mittelteichs u. in der Richtung nach Krinitz; im Busch vor Pademagk; am Gr.-Teich bis Wanninchen hin!

*Koeleria cristata* Pers. 6,7. Grasgrün, 2. flach, kurz zottig. Auf trockenem Boden i. d. Niederl. nicht selten Rbh.

*K. glauca* D.C. 6,7. Graugrün, fast. Wie vor.

*Briza media* L. Zittergras. 5—7. Trockne Wiesen, gemein.

*Dactylis glomerata* L. Rindgras. 5—7. Wiesen u. a. D. gemein.

*Poa* L. Rispengras.

A. Wj. faserig, ohne Ausläufer.

1. Rispenäste einz. od. zu 2.

*P. annua* L. Dedb. mit Ausnahme der verbindenden Welle fast. Wege u. Gartenland, gemein.

*P. bulbosa* L. (Form *vivipara*). 5,6. Dedb. seidenha. Stg. an Gr. meist zwieblig verdickt, Ac. h. in Laubprossen auswachsend. D. d. G. nicht grade selten: N. St. Lu. Nordseite der Promenade! Ferner Thongruben; Bornsd. Weg von Trebbinchen nach Bergen!

2. Untere Rispenäste zu 5.

a. Dedb. mit seidenha. Linien, unbedeutlich 5nervig.

*P. serotina* Ehrh. (*palustris* Rth.). 6,7. B. häutchen länglich, spiz. Nicht selten: Lu. Hainwiesen; Cahnsd. südl. bis zur Ziegelei!

*P. nemoralis* L. 6,7. B. häutchen fast fehlend. Lu. Am u. im Hain; Cahnsd. Wall. F. Drehna, nach Stiebsd. zu im Laubwalde.

b. Dedb. ohne beha. Randlinien, mit 5 starken Nerven.

† *P. Chaixi* Vill. 6,7. B. häutchen kurz, 2st. groß, stark. \*Grasplätze des Parks von F. Drehna, bestandsbildend A.

*P. trivialis* L. 6,7. B. häutchen (an den ob. Stb.) länglich, spiz. Zw. Lu. u. dem Hain nicht selten, auch sonst auf feuchten Wiesen!

B. Wj. stiel mit langen Ausläufern, kriechend.

*P. pratensis* L. 5,6. St. durch lange Welle verbunden, Dedb. mit 5 starken Nerven. Wiesen, Wälder, Triften, gemein.

**Var. angustifolia** L. (B. der Laubtriebe borstentfg.) Lu. auf der Mauer des Reuß'schen Hofes an der Promenade!

**Poa compressa** L. 6,7. St. fast frei. Halm zweischneidig, Dedb. undeutlich nervig. An trocknen Begrändern, auf Lehm im Lu.!

**Catabrosa aquatica** P.B. 5—10. Gräben bei Gehren u. Weissagk Rbh.

**Glyceria fluitans** R.Br. Schwaben. 5—7. B.häutchen lang, Rispe schmal, armährig. Gräben u. Ufer, gemein.

**G. aquatica** Wahlberg. 6—8. B.häutchen sehr kurz, Rispe dicht, vielährig. Lu. im Stadtgraben; hinter dem Schützenhause; am Gießmarschen Fließ!

**Festuca** L. Schwingel.

I. Ae. h. zusammengebrüdt. Fr. eingeschlossen.

A. St. mit 1 Staubgefäß.

**F. pseudo-myrurus** Sey. Will. 6—10. S. bis zur Spitze mit B.scheiben besetzt. \*Uckro, an der Straße nach Schlieben, zahlreich A.

**F. sciuroides** Rth. 6,7. S. oberwärts ohne B.scheiben. \*Uckro, beim Bahnhofe u. von dort an Ädern u. Begrändern längs der Straße nach Schlieben verbreitet A. Wüstermarke Schluch!

B. St. mit 3 Staubgefäßen.

1. B.häutchen 2öhrig, länglich.

**F. ovina** L. 6,7. B. alle borstlich. Ueberall gemein, auch angeäst.

**F. rubra** L. 6,7. S. ständige B. flach. Lu. zw. Stadt u. Hain!

2. B.häutchen nicht 2 öhrig kurz, gestutzt.

aF. **gigantea** Vill. 7,8. Dedb. begrannt. D. d. G. nicht selten: Lu. im Hain; in allen Laubwaldungen am Fuße des Höhenzuges im B. von Uckro bis Waltersdf. u. Gehren; Fresdf.!

b. Dedb. grannenlos.

**F. arundinacea** Schreb. 6,7. Rispe auch nach b. St. ausgebreitet. Bei Pitschen u. Pickel! (zu bestätigen).

**F. elatior** L. 6,7. Rispe einseitigwendig, nach b. St. aufgezogen, gr. fib. Zweige nur mit 1 ob. 2 Ae. h. Ueberall gemein.

II. **F. distans** Kth. 6—10. Ae. h. fiedtrund, Fr. frei. Lu. am Wege nach Zaakow; Langengrassau, bei der Ziegelscheune Rbh.

**Cynosurus cristatus** L. Rammgras. 6—8. Wiejen, Trijten, häufig.

**Bromus L. Trespe.**

A. Ae. ch. gegen die Spitze hin verjüngt.

\* Unteres Hüllb. 3—nervig, Vorb. am Rande steif gewimpert.

1. B. *secalinus* L. 6,7. B. scheiden fast. Unter Roggen nicht selten: Lu. Cahnsd. Zöllmersd. beim Chausseehaue!

2. Untere B. scheiden beha.

a. Dedb. länger als das Vorb.

B. *mollis* L. 5,6. Ae. ch. u. B. weichha. Gemein.

B. *racemorus* L. 5,6. Ae. ch. fast. Nördl. von Lu. n. bei Karche auf feuchten Wiesen!

b. B. *arvensis* L. 6,7. Dedb. u. Vorb. gleich lang. Gehren auf der Höhe bei Leberchts Ziegelei!

\*\* B. *inermis* Ley. 6,7. unt. Hüllb. Inervig. Zerstreut d. d. G. A.

B. Ae. ch. gegen die Spitze hin verbreitert.

B. *sterilis* L. 5,6. Halm ganz kahl, [B. weichha.] Lu. Stadtmauer; an d. Chaussee nach Wittmannsd.!

B. *tectorum* L. 5,6. Halm oberwärts meist weichh. [Ae. ch. oft zottig.] Nicht selten, z. B. Lu. Schanze!

**Brachypodium pinnatum** P.B. Zweife. 6,7. Gr. achse kriechend, Stg. steif, zw. den Knoten kahl. \*F. Drehna, Weinbg. A. Am Wege von Stiebsd. nach Bornsd. Weissagk Schw.

B. *silvaticum* P.B. 7,8. Wj. rasenf. Stg. schlaff, zw. den Knot u. zerstreut rauhha. F. Drehna, Busch vor Pademagk u. Weinbg. Gehren, unweit der Bergschenke Schw.

**Triticum Tourn. Weizen.**

1. Ausdauernde [wildel] Arten:

T. *repens* L. Quecke, 6,7. Gr. achse kriechend, Ausläufer treibend. Gem. als Unkraut auf Aedern. var. *caesium* Presl. [Untere Scheiden rückwärts rauhha.] \*F. Drehna, Weinbg. A.

T. *caninum* L. 6,7. Pfl. rasenf., nicht kriechend. Schattige Laubwälder, nicht häufig. Rbh. (Ohne St. D.)

2. Nicht ausdauernde [gebaute] Arten.

† T. *vulgare* Vill. Weizen. 6,7. Hüllb. bauchig. Gebaut.

† T. *cereale* Asch. Roggen. 5,6. Hüllb. pfriemf., Ae. ch. 2btz. Gebaut.

**Hordeum Mneh. Gerste.**

1. Dedb. breit elliptisch, [gebaute Arten].

† H. *vulgare* L. Winter=G. 6,7. Alle Ae. ch. sitzend. Gebaut.

† H. *distichum* L. Sommer=G. 6,7. Seiten=ä. ch. kurz gestielt, angebrüdt. W. v.

2. H. *murinum* L. 6—10. Dedb. lanzettlich. Begründer, gem.

**Lolium L.** Lolch.

1. *L. temulentum* L. Taumel-L. 6,7. Hüß: wenigstens so lang als die St. Vereinzelt d. d. G.
2. Hüß. kürzer als die St.  
 † *L. multiflorum* Lmk. Ital. Rahgras. (Süddeutschland). 6—8. Stg. oberwärts rauh. Lu. Wiesen am Gohmarischen Fließ; in Görldsf. unter *Trifolium pr.* gesät u. vielfach verw.!
- L. perenne* L. Engl. Rahgras. 6—10. Stg. glatt. Gem. auch gebaut.

**II. Gymnospermae.**

## 108. Fam. Abietaceae.

- Pinus silvestris** L. Kiefer. 5. Gemein. Mit roten Staubbeuteln (*rubra* Mill.) \*in den Höllebergen; bei \*Bergen Magnus.
- † **P. strobus** L. Weymouths-K. (Nordamerika). 5. Rinde grau, 8. lang, dünn. In Parks, auf Kirchhöfen, angepflanzt.
- † **Larix decidua** Mill. Lärche. 4,5. Angepflanzt.
- Picea excelsa** Lk. Fichte od. Kottanne. 5. \*In größerem Bestande bei Gr.-Mossow A. Sonst vielfach einzeln u. in kleineren Beständen angepflanzt.
- † **Abies alba** Mill. Edeltaune 5. In Parks als Zierbaum.
- Juniperus communis** L. Wachholder. 4,5. Auf Leichdämmen, in Kiefernwäldern, nicht selten; z. B. Zieckau; Bornsd. F. Drehna! Auch zu Hecken u. zur Zierde angepflanzt.
- † **Sabina officinalis** Gke. Sadebaum. (Alpen). 4,5. Fr. turgel. In Parks, z. B. Cohnsd. angepflanzt!
- † **S. virginiana** Asch. (Nordamerika). 4,5. Fr. eifg. aufrecht. Nicht selten angepflanzt, z. B. Lu. Hanischs Garten.
- † **Thuia orientalis** L. Lebensbaum. (China). 4,5. 8. alle auf dem Rücken längsfurzig, Aeste in senkrechter Ebene verzweigt. Kirchhöfe zc.
- † **T. occidentalis** L. Lebensbaum. (Nordamerika). 4,5. 8. z. z. gefällt. Aeste in wagrechter Ebene verzweigt. Wie v.
- † **Taxus baccata** L. Eibe. 3,4. Zierbaum in Gärten.

**Kryptogamae L.**

## 109. Fam. Marsiliaceae Brogniart.

**Pilularia globulifera** L. 8,9. Pißchen Rbh.

## 110. Fam. Lycopodiaceae Mettenius.

**Lycopodium** Tourn. Bärlapp.

1. *L. selago* L. 9--11. Sporenbehälter einzeln b. winkelförmig. \*Gahroer Heide Kr.
2. Sporenbehälter in dachziegeligen Nehren.
  - a. Nehren sitzend, einzeln.
    - L. annotinum* L. 8,9. Stg. lang, B. entfernt scharf gesägt. \*Gahroer Heide Kr. \*Langengrassau, am Fuß der Höllenbg.!
    - L. inundatum* L. 8,9. Stg. kurz, B. ganzrandig. Wierigsdf; Fresdf., am Bordselt Rbh.
  - b. Nehren zu 2-6 auf einem Stiel.
    - L. clavatum* L. 7,8. St. lang kriechend, B. mit langen Vorstehenden. \*Rochauer Heide M.
    - L. complanatum* L. 8,9. Stg. kriechend, mit aufrechten Nehren, B. starr, spitz. \*Rochauer Heide M. \*Drehnaer Weinbg. 1864 A.

## 111. Fam. Equisetaceae Rich.

**Equisetum** Tourn. Schnabelhaln.

1. Kr. tragende Stg. blaß, einfach, von den Laubstg. verschieden.
  - E. arvense* L. 4,5. Nests 4-kantig, aufrecht abstehend, mit hakenförmigen Scheiden. Gemein, z. B. an den Chaussees nach Uckro u. Wittmannsd.!
  - E. pratense* Ehrh. 4. Nests fein, 3kantig, horizontal od. überhängend. Weissagk Rbh.
2. Kr. tragende Stg. den unfruchtbaren gleichend.
  - E. heleocharis* Ehrh. 5,6. Scheiden anliegend, mit 15-20 Zähnen. Häufig, z. B. Lu. Thongruben!
  - E. palustre* L. 5,6. Scheiden locker mit 6-8 Zähnen. Häufig.

## 112. Ophioglossaceae R.Br.

**Ophioglossum vulgatum** L. 7. Falkenbg. Rbh.**Botrychium lunaria** Sw. 6. Uckro, unweit des Mönchia Standortes Gabriel.

## 113. Osmundaceae Martius.

**Osmunda regalis** L. 6. \*Rochauer Heide, beim Forsthaus M. Wanninchen, an der Mühle! F. Drehna, in der Gasse Schw. Erlenbruch an der Scharfrichterei; Gemüse zw. Forsterei u. Biegelei; Laubwald süd-östl. davon!

## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsf. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro!

**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Hochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Gasse!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiebert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiebert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [fr. Häuschen hufeisenf. neben dem Mittelstreif der Fiederchen]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B.st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Niesernwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B.st. u. Mittelstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenf. Häuschens in der Bucht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.st. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Hochauer Heide, bei der Bechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Bismarck. 7,8. B.st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B.st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiebert. [unterste Fiedern fiederteilig]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiebert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

B. **A. aculeatum** Sw. Schleier des runden Häuschens schildf. angeheftet. Gahroer u. Kemnitzer Heide Rbh.

**Cystopteris filix fragilis** Bernh. 7,8. Weissagk; Krenitz Rbh.



















## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsüß. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro!  
**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Hochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Gasse!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weis-sagk; Langengrassau Rbh.

2. P. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhof-mauer M. Lu. Stadtmaner Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [Fr. häuschen hufeiseng. neben dem Mittelstreif der Fiederchen]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B. fil. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Niefernwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B. fil. u. Mittelstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenfg. Häuschens in der Bucht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.flächen. Langengrassau, Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz g. Hochauer Heide, bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Bunnfarn. 7,8. B. kugelförmig, sphaerischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei Drehna, Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B. fil. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert, sphaerischen berrn fiederteilig! Langengrassau; K.

**A. spinulosum** Sw. B. am Gr. mehrfach gefiedert, Höllenbergen!

B. **A. aculeatum** Sw. B. runden Häuschen, Gahro, Heide, Krinitz Rbh.

**Cystopteris filix** Bernh. 7,8. B. runden Häuschen, Gahro, Heide, Krinitz Rbh.





## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsj. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro!**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Hochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Gasse!**Asplenium** L.1. **A. trichomanes** L. 7,8. v. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. v. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [fr. Häufchen hufeisenförmig neben dem Mittelstreif der Fiederchen]. Langengrassau!**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. v. st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Meernwalde!**P. polypodioides** Fée. 7,8. v. st. u. Mittelstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenförmigen Häufchens in der Ducht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häufchen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren Bl. f. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!**A. montanum** Asch. 7,8. v. kurz gestielt. Hochauer Heide, bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häufchen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Bismarckfarn. 7,8.

Gefäßbündeln. Wanninchen, bei Langengrassau an den Höllenbergen!

b. v. st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. v. einfach. Bern fiederteilig! Langengrassau Rbh.**A. spinulosum** Sw. am Gr. Langengrassau, Höllenberge.B. **A. aculeatum** Sw. des ru. angeheftet. Gal.**Cystopteris filix** Bern  
Krintz Rbh.



## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engellisch. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro.  
**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Rochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Gaste!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. v. einfach gefiebert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. v. mehrfach gefiebert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [Kr. häufig hufeisenf. neben dem Mittelfstreif der Fiederchen]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. v. st. nur am Gr.

gen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr. = Mit einer Nierenwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. v. st. u. Mittelfstreif mit \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Lange Drenschuppen. Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenf. Häuschens in

1. Beide Gabeläste der Seitennerven

**A. thelypteris** Sw. 7,8. e  
baren B.flächen. Langengrassau A.

**A. montanum** Asch. 7,8.  
bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häu

a. **A. filix mas** Sw. Wurmf

stängeln. Wanninchen

grassau an den Höllen

5 Gefäßbündeln.

**A. acrostichum** Sw. 7,8.

erteiltig! Langengrassau

um Sw. 7,8.

au, an den

B. **A. adnigrum** Sw. 7,8.

ahroer u.

**Cystopteris** x fragi

Krin



## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsf. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro!  
**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der  
 Höllenbg. Matz. Rochauer Heide, nördl. der Chaussee nach  
 Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna,  
 an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Gaste!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [fr. Häuschen hufeisenf. neben dem Mittelfstreif der Fiederchen]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B.st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Riefernwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B.st. u. Mittelfstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

**A.** Schleier des nierenf. Häuschens in der Ducht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.st. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Rochauer Heide, bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Burnsfarn. 7,8. B.st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B.st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert. [unterste Fiedern fiederteilig]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiedert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

**B. A. aculeatum** Sw. Schleier des runden Häuschens schildf. angeheftet. Gahroer u. Kemnitzer Heide Rbh.

**Cystopteris filix fragilis** Bernh. 7,8. Weissagk; Krinitz Rbh.



## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsüß. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro!  
**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der  
 Höllenbg. Matz. Rochauer Heide, nördl. der Chaussee nach  
 Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna,  
 an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Guse!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [fr. Häuschen hufeisenf. neben dem Mittelfreiß der Fiederchen]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B.st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Rieserwald!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B.st. u. Mittelfreiß mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

**A.** Schleier des nierenf. Häuschens in der Ducht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.ästen. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Rochauer Heide, bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Burnfarn. 7,8. B.st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B.st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert. [unterste Fiedern fiederteilig]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiedert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

**B. A. aculeatum** Sw. Schleier des runden Häuschens schildf. angeheftet. Gahroer u. Kemnitzer Heide Rbh.

**Cystopteris filix fragilis** Bernh. 7,8. Weissagk; Kunitz Rbh.













## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsk. 8,9. \*Sohlweg bei Gahro!

**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Rochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Guse!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [Kr. Häuschen hufeiseng. neben dem Mittelstreif der Fieberchen]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B. st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Miesernwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B. st. u. Mittelstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenf. Häuschens in der Bucht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B. st. Äschen. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Rochauer Heide, bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Burnfarn. 7,8. B. st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B. st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert. [unterste Fiebern fiederteilig]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiedert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

B. **A. aculeatum** Sw. Schleier des runden Häuschens schildf. angeheftet. Gahroer u. Kemnitzer Heide Rbh.

**Cystopteris filix fragilis** Bernh. 7,8. Weissagk; Krinitz Rbh.



## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsjüß. 8,9. \*Sohlweg bei Gahro!

**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Rochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Guse!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [Kr. Häuschen hufeisenförmig, neben dem Mittelstreif der Fiederchen]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B.st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Niefernwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B.st. u. Mittelstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenförmigen Häuschens in der Bucht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitenerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.st. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Rochauer Heide, bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Burnsfarn. 7,8. B.st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B.st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert. [unterste Fiedern fiederteilig]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiedert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

B. **A. aculeatum** Sw. Schleier des runden Häuschens schildförmig angeheftet. Gahroer u. Kemnitzer Heide Rbh.

**Cystopteris filix fragilis** Bernh. 7,8. Weissagk; Krinitz Rbh.





## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsküh. 8,9. \*Sohlweg bei Gahro!  
**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Rochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Gasse!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [Fr. häufchen hufeisenfg. neben dem Mittelstreif der Fiedern]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B.st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Mejerwald!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B.st. u. Mittelstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenfg. Häufchens in der Bucht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häufchen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.stücken. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Rochauer Heide, bei der Bechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häufchen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Wurmfar. 7,8. B.st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B.st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert. [unterste Fiedern fiederteilig]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiedert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

B. **A. aculeatum** Sw. Schleier des runden Häufchens schildfg. angeheftet. Gahroer u. Kemnitzer Heide Rbh.

**Cystopteris filix fragilis** Bernh. 7,8. Weissagk; Krinitz Rbh.

















## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsjüß. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro!

**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Rochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Gufte!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [fr. Häuschen hufeisenf. neben dem Mittelfstreif der Fiederchen]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B.st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Kiefernwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B.st. u. Mittelfstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenf. Häuschens in der Bucht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.stächen. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Rochauer Heide, bei der Bechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Wurmfar. 7,8. B.st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B.st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert. [unterste Fiedern fiederteilig]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiedert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

**A. ad-nigrum** Sw. Schleier des runden Häuschens schiffsf. Gahroer u. Kemnitzer Heide Rbh.

**A. filix fragilis** Bernh. 7,8. Weissagk;



## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engellisch. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro!

**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Rochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Gaste!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [Fr. Häuschen hufeisenf. neben dem Mittelstreif der Fiedern]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B.st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich in Niesernwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B.st. u. Mittelstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenf. Häuschens in der Bucht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.stücken. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Rochauer Heide, bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Burmfarn. 7,8. B.st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B.st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert, [unterste Fiedern fiederteilig]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiedert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

B. **A. aculeatum** Sw. Schleier des runden Häuschens schildf. angeheftet. Gahroer u. Kemnitzer Heide Rbh.

**Cystopteris filix fragilis** Bernh. 7,8. Weissagk; Krinitz Rbh.



## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium vulgare** L. Engelsf. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro!

**Pteris aquilina** L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum spicant** With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Hochauer Seide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Guse!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [fr. Häuschen hufeisenf. neben dem Mittelfstreif der Fiederchen]. Langengrassau!

**Phegopteris dryopteris** Fée. 7,8. B.st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Niefernwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B.st. u. Mittelfstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenf. Häuschens in der Bucht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.st. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Hochauer Seide, bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Burmfarn. 7,8. B.st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B.st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert. [unterste Fiedern fiederteilig!]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiedert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

B. **A. aculeatum** Sw. Schleier des runden Häuschens schiffsf. angeheftet. Gahroer u. Kemnitzer Seide Rbh.

**Cystopteris filix fragilis** Bernh. 7,8. Weissagk; Krinitz Rbh.



## 114. Fam. Polypodiaceae R.Br. Farn.

**Polypodium** vulgare L. Engellisch. 8,9. \*Hohlweg bei Gahro!

**Pteris** aquilina L. 7,8. Trockne Wälder, gemein.

**Blechnum** spicant With. 7,8. \*Langengrassau, Fuß der Höllenbg. Matz. Rochauer Heide, nördl. der Chaussee nach Schlieben M. Wanninchen, unweit der Mühle; F. Drehna, an allen feuchten Waldstellen, besonders üppig in der Gaste!

**Asplenium** L.

1. **A. trichomanes** L. 7,8. B. einfach gefiedert. Weissagk; Langengrassau Rbh.

2. B. mehrfach gefiedert.

**A. ruta muraria** L. 3—15 cm hoch. \*Langengrassau, Kirchhofsmauer M. Lu. Stadtmauer Schw.

**A. filix femina** Bernh. 7—9. 30—130 cm hoch, [fr. Häuschen hufeisenförmig, neben dem Mittelfstreif der Fiedern]. Langengrassau!

**Phegopteris** dryopteris Fée. 7,8. B.st. nur am Gr. mit einigen Spreuschuppen. Zw. Wanninchen u. dem Gr.-Teich im Kiefernwalde!

**P. polypodioides** Fée. 7,8. B.st. u. Mittelfstreif mit Spreuschuppen. \*Erlenbruch am Fuß der Höllenbg. bei Langengrassau A.

**Aspidium** Sw.

A. Schleier des nierenförmigen Häuschens in der Bucht angeheftet.

1. Beide Gabeläste der Seitennerven der Abschnitte 1 Häuschen tragend.

**A. thelypteris** Sw. 7,8. Stg. etwas länger als die unfruchtbaren B.st. Langengrassau, Fuß der Höllenbg.!

**A. montanum** Asch. 7,8. B. kurz gestielt. Rochauer Heide, bei der Pechhütte M.

2. Nur der vordere Gabelast 1 Häuschen tragend.

a. **A. filix mas** Sw. Burmfarn. 7,8. B.st. mit 7 peripherischen Gefäßbündeln. Wanninchen, bei der Mühle; Langengrassau an den Höllenbergen!

b. B.st. mit 5 Gefäßbündeln.

**A. cristatum** Sw. 7,8. B. einfach gefiedert, [unterste Fiedern fiederteilig]. Langengrassau; Kemnitz Rbh.

**A. spinulosum** Sw. 7,8. B. am Gr. mehrfach gefiedert. Langengrassau, an den Höllenbergen!

B. **A. aculeatum** Sw. Schleier des runden Häuschens schildförmig angeheftet. Gahroer u. Kemnitzer Heide Rbh.

**Cystopteris** filix fragilis Bernh. 7,8. Weissagk; Krinitz Rbh.













